

Anna Klásková:

Combinations novae generis *Cytisi* L. s. 1.

Beim Studium der Gattung *Cytisus* L. habe ich festgestellt, dass die Gattung *Cytisus* L. nach bisheriger Auffassung vom taxonomischen Standpunkte sehr uneinheitlich ist. Infolgedessen halte ich eine Trennung einiger Arten von dieser Gattung und ihre Einteilung in selbständige Gattungen, wie dies schon früher manche Autoren getan haben, für richtig.

Die Arten der Gattung *Cytisus* L. habe ich in folgende Gattungen eingeteilt: *Chamaecytisus* Link, *Coroethamnus* Presl, *Lembotropis* Griseb., *Cytisus* L.

Bei dieser Einteilung entstanden einige neue Kombinationen, deren Übersicht ich hier der Priorität wegen anführe:

- Chamaecytisus albus* Haecq. f. *pallidus* (Schr ad.) comb. n. = *Cytisus leucanthus* var. *pallidus* Schr ad. in DC. Prodr. 2:155, 1825.
- Chamaecytisus ambiguus* (Schur) comb. n. = *Cytisus ambiguus* Schur Enum. pl. Trans. 147, 1866 = *Cytisus virescens* (Kováts) Kern. Abhäng. Pflanzengest. 8, 1869.
- Chamaecytisus borysthenicus* (Grun.) comb. n. = *Cytisus borysthenicus* Grun. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 41/4: 446, 1869.
- Chamaecytisus hirsutus* ssp. *ciliatus* (Wahlenb.) comb. n. = *Cytisus ciliatus* Wahlenb. Fl. Carpat. princip. 219, 1814.
- Chamaecytisus lindemanni* (V. Krecz.) comb. n. = *Cytisus lindemanni* V. Krecz. in Journ. Bot. URSS 25/3, 259, 1940.
- Chamaecytisus litwinovii* (V. Krecz.) comb. n. = *Cytisus litwinovii* V. Krecz. in Journ. Bot. URSS 25/3: 256, 1940.
- Chamaecytisus paczoskii* (V. Krecz.) comb. n. = *Cytisus paczoskii* V. Krecz. in Journ. Bot. URSS 25/3: 261, 1940.
- Chamaecytisus podolicus* (Blocki) comb. n. = *Cytisus podolicus* Blocki in Allg. Bot. Zeitschr. 1: 137, 1895.
- Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch.) comb. n. = *Cytisus ruthenicus* Fisch. ex Bess. En. pl. 29 et 74, 1822 (nomen) atque in Ind. pl. Hort. Petrop. 25, 1824 (nomen) et ex Woloz. in OBZ 36: 151, 1886 (descriptio).
- Chamaecytisus skrobiszewskii* (Pacz.) comb. n. = *Cytisus skrobiszewskii* Pacz. in Acta Bot. Pol. 2/1: 65, 1924.
- Chamaecytisus wulfii* (V. Krecz.) comb. n. = *Cytisus wulfii* V. Krecz. in Journ. Bot. URSS 25/3: 262, 1940.
- Chamaecytisus zingeri* (Nenuk.) comb. n. = *Cytisus zingeri* (Nenuk.) V. Krecz. in Journ. Bot. URSS 3: 260, 1940. = *Cytisus ruthenicus* var. *zingeri* Nenuk. ex Litv. in Majevskij Fl. sred. Ross. ed. 5: 133, 1917.
- Coroethamnus agnipilus* (Vel.) comb. n. = *Cytisus agnipilus* Vel. Fl. bulg. 643, 1891.
- Lembotropis nigricans* var. *nigricans* f. *pubescens* (Briž.) comb. n. = *Cytisus nigricans* L. f. *pubescens* Briž. Sborník klubu přír. Brno 22/1939: 76, 1940.
- Lembotropis nigricans* var. *mediterraneus* (Pant.) comb. n. = *Cytisus nigricans* L. var. *mediterraneus* Pant. in OBZ 23: 5, 1873.
- Lembotropis glabrescens* (Sart.) comb. n. = *Cytisus glabrescens* Sart. Alb. Indig. Ital. Sup. 282, 1816.

Die Begründung dieser Auffassung selbständiger Gattungen sowie ihre Unterscheidungsmerkmale führe ich in einer nachfolgenden Studie an.