

Beitrag zur Flora des Oberlaufes der Flüsse Svitava und Třebůvka im Nordwesten Mährens

Der Verfasser legt in dieser Arbeit einen Bericht über die Ergebnisse seiner botanischen Forschung des bisher nur wenig durchforschten Gebietes des nordwestlichen Mährens und des angrenzenden Bereiches Böhmens vor. Durch eine Reihe neu festgestellter Standorte von thermophilen Pflanzen vertieft und präzisiert er die phytogeographische Bedeutung der Boskowitz Furche (Boskovická brázda) und der Kleinen Hanna (Malá Haná). Standorte *thermophiler* Pflanzen, wie *Polygala major*, *Scabiosa canescens*, *Geranium sanguineum* u. a. bezeichnen in diesem Gebiete Mährens die entferntesten isolierten kleinen Inseln der thermophilen Flora, welche die südmährische pannonische Zone mit dem nordmährischen Becken (Hornomoravský úval) verbindet.

In der zweiten Gruppe werden Arten der Pflanzenordnung *Fagetales*, der Verbände *Fagion* und *Carpinion* behandelt, welche in dieser — heute durch Fichtenforste bewachsenen — Zone zur Rekonstruktion der ursprünglichen natürlichen Buchen-, Buchentannen- und Eichenweissbuchenbestände dienen.

Merkwürdig ist die Entdeckung der karpatischen Art *Luzula luzulina* und ihrer Hybriden mit *Luzula pilosa* (L.) WILLD. (*Luzula vinesii* MURR.) im subherzynischen Florenbezirk, weiter wurden Standorte der karpatischen Art *Crocus heuffelianus* und eines seltenen Hybriden *Carex arthuriana* BECKM. et FIGERT. festgestellt,

Südöstlich von Polička wurden neu vier Niedermoorwiesen festgestellt, von denen die grösste „Balda“ bei Dolní Jedlová, 600 m ü. d. M., liegt; die Niedermoorvertiefung beträgt 2 m,

František Č e r n o c h :

Je v Československu *Artemisia laciniata* WILLD.?

V DOSTÁLOVĚ „Klíč k úplné květeně ČSR“ z r. 1954 a 1958 je z území ČSSR uváděna *Artemisia laciniata* WILLD. a *Artemisia pančičii* (JANKA) RONN. V „Květeně ČSR“ z r. 1950 uvádí DOSTÁL *Artemisia laciniata* WILLD. z jižní Moravy od Mikulova, Čejče, Bořetic a z Pouzdřanských kopců, ze Slovenska z Malých Karpat, *Artemisia pančičii* RONN. z Pouzdřanských kopců a předpokládá její výskyt na jižním Slovensku.

U moravských rostlin a s největší pravděpodobností i u slovenských rostlin, které jsem však neviděl, běží o záměnu *Artemisia laciniata* WILLD. s *Artemisia pančičii* RONN. PODPĚRA považoval původně jihomoravské rostliny za *Artemisia laciniata* WILLD. Část sběrů, které jsou majetkem botanického ústavu brněnské university, byla poslána WENDELBERGEROVI do Vídně k revisi. Ten je označil správně jako *Artemisia pančičii* RONN. subsp. *austriaca* WENDELB.

V tomto smyslu je nutno opravit herbáře.

Artemisia laciniata WILLD. se od *Artemisia pančičii* RONN. značně liší. Na území ČSSR dosud nebyla nalezena a proto zatím nepatří do naší květeny.