

Poznámky ke květeně jihovýchodní části Podunajské nížiny

Anmerkungen zur Flora des südöstlichen Teiles der slowakischen Donautiefebene

Jindřich Chrtek, Bohdan Křísa a Zdeňka Slavíková

CHRTEK J., B. KŘÍSA et Z. SLAVÍKOVÁ (1972): Poznámky ke květeně jihovýchodní části Podunajské nížiny. [Anmerkungen zur Flora des südöstlichen Teiles der slowakischen Donautiefebene.] — Preslia, Praha, 44 : 52–66. — Es werden die Resultate der floristischen Durchforschung des südöstlichen Teiles der Donautiefebene veröffentlicht. Das Untersuchungsgebiet ist durch die Linie Komárno—Nové Zámky—Gbelce—Kravany nad Dunajom—Komárno begrenzt. In diesem Beitrag sind 217 Arten angeführt, und zwar vorwiegend die häufigen Arten, welche manchmal in phytogeographischer Hinsicht wichtig sind. Aus diesem Gebiet sind bisher relativ wenig konkrete Lokalitäten bekannt. Wir haben in diesem Beitrag nur die taxonomisch weniger komplizierten Arten angeführt; weniger häufige und kritische Arten sollen in einem weiteren Artikel behandelt werden. — *Botanisches Institut der Karls-Universität, Benátská 2, Praha 2, Tschechoslowakei.*

V květnu a červenci r. 1970 jsme pracovali v jihovýchodní části Podunajské nížiny v území Komárno—Nové Zámky (hranice tvořil levý břeh řeky Nitry a Váhu) — Gbelce (zde byla hranice vymezena železniční tratí Nové Zámky—Štúrovo) — Kravany nad Dunajom — Komárno. V této oblasti jsme botanizovali téměř jeden měsíc a nashromáždili ca 2100 položek.


Území v němž jsme pracovali, vytváří geomorfologicky přechod mezi Velkým Žitným ostrovem a Hronskou tabulovou pahorkatinou. Přibližnou hranici mezi těmito dvěma územními celky je dolní tok řeky Žitavy, a to v prostoru mezi obcemi Martovce a Žitavská Tôň. Jihozápadní část studovaného území, Komárno — Lándor pusta — Martovce — Žitavská Tôň — Komárno, tvoří poslední výběžky Velkého Žitného ostrova. Je to nížina s četnými slepými rameny a regulačními kanály zejména při dolním toku řeky Nitry. V poslední době vlivem vodo hospodářských úprav jsou některé přírodní celky (slepá ramena, tuně, podmáčené louky, slaniska) na ústupu. Zbývající část území náleží geomorfologicky k jižním výběžkům Hronské tabulové pahorkatiny, která je od vlastní nížiny ohrazena souvislým pásmem vátých písků probíhajících od obce Nesvady přes obec Imel, Hurbanovo, Chotín, Marcelová, Virt, Radvaň nad Dunajom. Na toto pásmo navazují bezprostředně vyvýšeniny Hronské tabulové pahorkatiny, která vyplňuje většinu studovaného území a je tvořena neogenními usazeninami, které jsou převáty sprašemi.

Nejvyšší vrchol téhoto vyvýšení je kóta 250 m (Nový les) severně od obce Modrany. Celou tu vrcholovou zalesněnou část se sousedními odlesněnými vyvýšeninami označujeme jako Modranská pahorkatina. DOSTÁL (1960) rád toto území do obvodu xerothermní panonské květeny, okresu Podunajská nížina, okrsku Hronská tabule. FUTÁK (1966) neuvedl v okresu Podunajská nížina žádné podrobné třídění. Podle našeho názoru není studované území fytogeograficky jednotné. Geomorfologická charakteristika je v souladu s fytogeografickými poměry, to znamená, že jihozápadní část v prostoru Komárno — Martovce — Žitavská Tôň náleží do květenného okresu Žitný ostrov a zbývající část patří již okrsku zmíněné Hronské tabule. Z větších prací, které se svou tématikou dotýkají našeho území, jmenujeme předešlým práce téhoto autorů: KNAPP (1864), SCHILLER (1865), KRIST (1937 až 1940), OSVÁČILOVÁ (1956), MÁJOVSKÝ (1961) a FUTÁK (1962). V novější době pracovala v území příležitostně řada botaniků, zejména slovenských.

V tomto příspěvku jsme se pokusili zaznamenat rozšíření některých zpravidla běžných a taxonomicky poměrně jasných druhů, jejichž rozšíření v Podunajské nížině nebylo dostatečně známe. Druhy, které považujeme za taxonomicky obtížnější zveřejníme v dalším příspěvku. Označení nalezišť je většinou podle názvosloví z topografických map (1 : 50 000) z roku 1952. Nomenklatura taxonů je ve většině případů podle: DOSTÁL J. (1958): Klíč k úplné květeně ČSR. Ed. 2. — Praha.

Acer tataricum L. — Lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (jz. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice); jv. od obce Marcelová; již. od obce Patince-kúpele. FUTÁK (1962): Drieňová hora, mezi obcemi Nové Zámky a dvorem Aňala.

Achillea setacea W. et K. — Křovinaté stráně a meze. Mezi kótou Bašov kopec a dvorem Mašan; jv. od obce Marcelová; okolí obce Domáňovská Pustatina; sv. od obce Virt; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. KRIST (1937b): Drieňová hora.



Obr. 1. — Schématická mapa studované oblasti. Seznam nejčastěji použitých lokalit v textu. — 1. dvor Kotelnica; 2. Timonova myslivna; 3. Rókalyuk pusta; 4. Sesileš; 5. Horný Vek; 6. Dolný Vek; 7. louky Komočín; 8. Ďulov dvor; 9. Kolozs majír; 10. Chotín — železniční stanice; 11. les Čenka; 12. Veľká Kamenná Pustatina; 13. Malá Kamenná Pustatina; 14. vrch Kurta; 15. dvor Horáreň; 16. Žltý dom; 17. Pribetský dvor; 18. Pribetský les — myslivna; 19. Nový les; 20. Chrbát; 21. kóta 212 m; 22. Suchý vrch; 23. Močodisko; 24. Veľká dolina; 25. Bašov kopeec; 26. Veterný vršok; 28. dvor Mašan; 29. Domáňovská Pustatina; 30. Močská Pustatina; 31. Komárno-tehelňa; 32. Malý Haresás; 33. Haresás pusta; 34. kóta 112 m; 35. Patince-kúpele; 36. dvor Slukoviny; 37. kóta 226 m, Novoveské vinice; 38. Drieňová hora.

Acorus calamus L. — Bažiny a mokřady. Levý břeh řeky Žitavy a Nitry mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesileš, Horný a Dolný Vek, Martovce, Komočín, Láendor pusta); při Dunaji vých. od obce Moča. HEJNÝ (1960): jen mezi obcemi Komárno a Stúrovo.

Adonis aestivalis L. — Pole a úhory. Imel'; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

A. vernalis L. — Stepní a křovinaté stráně. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; svahy sz. od obce Šrobárová; Suchý vrch a kóta 212 m sv. a sev. od obce Modrany; již. od kót Nový les; Novoveské vinice. Na mnohých místech mizí, protože lokality jsou zarůstány křovinami a zejména akátovými porosty. STARÝ (1952): Gbelee; KRIST (1937b), OSVÁČILLOVÁ (1956) a FUTÁK (1962): Drieňová hora.

Agrimonia eupatoria L. — Travnaté stráně a meze. Mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta); dvor Kotelnica sz. od obce Bajč; okolí obce Dulovce; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; stráňka sz. od obce Šrobárová; kóta 212 m a Suchý vrch sev. a sv. od obce Modrany; sz. od obce Vojnice; Novoveské vinice; mezi obcemi Kravany n. D. a Moča na více místech.

Agrostemma githago L. — Opuštěná místa. Záp. od obce Horný Vek; úpatí kopce Novoveské vinice.

Allium angulosum L. — Pobřežní mokřiny. Levý břeh řoky Žitavy a Nitry mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Horný Vek, Komočín, Láendor pusta); u Dunaje při kótě 112 m záp. od obce Iža a již. od obce Patince-kúpele. HENDRYCH (1968) je z území neuvádí.

Alyssum calycinum L. — Suchá stanoviště. Imel; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Amaranthus albus L. — Ruderální stanoviště a u cest. Imel; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Komárno; Chotín; Patince; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

Amygdalus nana L. — Křovinaté stráně. Sz. od obce Šrobárová; Novoveské vinice. OSVÁČILOVÁ (1956) a FUTÁK (1962): Novoveské vinice.

Anchusa officinalis L. — Suché travnaté stráně a podél cest. Nesvady; Imel; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska. KRIST (1939) se zmíňuje o var. *angustifolia* DC. z obcí Chotín a Čenkov. Taxonomická hodnota tohoto taxonu je sporná. Soó (1968) ji považuje za pouhou formu od var. *officinalis*.

Anemone ranunculoides L. — Lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (jz. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát).

Anthemis ruthenica M. B. — Suché písčité půdy. Sv. od obce Imel; Rókalyuk pusta; vých. od obce Nesvady; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); sv. od obce Dulovce; záp. od obce Dolný Peter; již. od obce Malá Kamenná Pustatina; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, dvor Mašan, Veterný vršok, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tôň); mezi obcemi Modrany a Moča na více místech; Moča. KRIST (1939); Balázstág u obce Hurbanovo; MÁJOVSKÝ (1961); Marcelová; FUTÁK (1962); mezi obcemi Bajč a Imel, Moča.

Anthericum ramosum L. — Západní svah kóty 212 m sev. od obce Modrany. SKALICKÝ (1959): Drieňová hora.

Anthriscus cerefolium (L.) HOFFM. subsp. *trichosperma* (SCHULT.) ARCANG. — Lesní porosty. Les u dvora Kotelnica sz. od obce Bajč; u obce Chotín; Veľká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; Čenka jz. od obce Dolný Peter; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi obcemi Pribeta a Vojnice na mnoha místech; jv. od obce Marcelová; sev. od obce Žitavská Tôň.

Apera spica-venti (L.) P. BEAUV. — Pole, písčité půdy, váté písky. Okraj obce Imel; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; dvor Kotelnica sz. od obce Bajč; Veľká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); pískoviště sv. od obce Dulovce a sz. od obce Dolný Peter; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. okraj obce Marcelová, Bašov kopec, dvor Mašan, Veterný vršok, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tôň); mezi obcemi Modrany a Moča na více místech.

Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH. — Písčité úhory. Již. od obce Malá Kamenná Pustatina; jz. od obce Dulovce; u hřbitova na sv. okraji obce Modrany; chatová základna u obce Radvaň n. D.

Aristolochia clematitis L. — Příkopy, okraje silnic a řek, lesy. Na sv. okraji obce Imel; u dvora Kotelnica sz. od obce Bajč; břehy řeky Žitavy, Nitry a Váhu souvisle a někdy v rozsáhlých porostech až k obci Komárno; podél toku Dunaje od obce Komárno přes obec Iža, Patince, Radvaň n. D., Moča, po Kravany n. D.; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; Virt; jv. od obce Marcelová; mezi obcemi Modrany a Moča na více místech. Srov. mapa rozšíření v ČSSR HOLUBOVÁ et SLAVÍKOVÁ (1964).

Artemisia absinthium L. — Ruderální stanoviště a u cest. Železniční stanice Hurbanovo; Veľká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; železniční stanice Chotín; mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; Dolný Peter; Vojnice; Moča; jz. svah Novoveských vinic.

A. pontica L. — Suchá travnatá stanoviště. Láendor pusta sev. od obce Komárno; Haresás pusta mezi obcemi Komárno a Iža; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. FUTÁK (1962): u obce Komárno.

Asparagus officinalis L. — Travnaté a křovinaté stráně. Sv. od obce Imel; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; Sesileš u obce Hurbanovo; Komárno-tehelňa; Láendor pusta sev. od obce Komárno; mezi železniční stanicí a obcí Chotín; u lesa Čenka u obce Dolný Peter; Suchý vrch sv. od obce Modrany; sz. od obce Vojnice; okolí obce Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; mezi obcemi Žitavská Tôň a Radvaň n. D.; záp. od obce Kravany n. D.; stráň sz. od obce Šrobárová.

Asperugo procumbens L. — Druhotná stanoviště. Okolí dvora Kotelnica sz. od obce Bajč; Sesileš u obce Hurbanovo; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta, kótá 112 m); již. od obce Veľká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; v okolí obce Modrany (Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Marcelová a Virt (Bašov kopec, kótá 131 m u dvora

Mašan, Domáňovská Pustatina); u hájovny v Pribetském lese jv. od obce Dulovce; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.

Asperula odorata L. — Listnaté lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Nový les, Chrbát); při řece Dunají již. od obce Patince-kúpele.

Astragalus cicer L. — Travnaté porosty při cestách. U dvora Kotelnica sz. od obce Bajč; Lándor pusta sev. od obce Komárno; Komárno-tehelňa; Haresás pusta mezi obcemi Komárno a Iža; sv. od obce Dulovce; mezi obcemi Dulovce a Dolný Peter; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; stráňky sz. od obce Šrobárová; Suchý vrch sv. od obce Modrany; sv. od obce Vojnice; Močodla záp. od obce Búč; mezi obcemi Kravany n. D. a dvorem Slukoviny, Novoveské vinice. FUTÁK (1962): na kótě Novoveské vinice a Drieňová hora.

A. glycyphyllos L. — Lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, jz. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Modrany a sz. od obce Vojnice); Veľká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; Suchý vrch sv. od obce Modrany.

Avenochloa pubescens (Huds.) Holub — Paseky, křovinaté stráně, lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (u hájovny v Pribetském lesu, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice); Novoveské vinice.

* *Berteroa incana* (L.) DC. — Výslunná suchá stanoviště, u cest. Komárno-tehelňa; Haresás pusta; Veľká Kamenná Pustatina; Dolný Peter; mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; Modrany; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi obcemi Mudroňovo a Dulovce; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce Marcelová, Bašov kopec, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tôň); Moča; mezi obcemi Moča a Kravany n. D. na více místech.

Betonica officinalis L. — Travnaté stráně a paseky. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; Žltý dom sz. od obce Šrobárová; Suchý vrch sv. od obce Modrany; u kótě Nový les mezi obcemi Pribeta a Vojnice.

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. — Podmáčené alkalické půdy. Komárno-tehelňa na vých. okraji při silnici Komárno – Iža ve velkém množství; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. jen v několika exemplářích. KRIST (1937a): uvádí nejbližší lokalitu u obce Nová Straž. SVOBODOVÁ (1966b): Moča.

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng — Travnaté stráně. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; okolí dvora Horáreč a dvora Žltý dom sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany (Kamenica, kóta 212 m, Suchý vrch); mezi obcemi Marcelová a Virt (Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina). KRIST (1938): Chotín, (1939): vrch Kurta, Radvaň n. D., dvor Mária u obce Kravany n. D.; FUTÁK (1962): mezi obcemi Bajč a Imeľ, Modrany, Žitavská Tôň, Nová Vieska.

Butomus umbellatus L. — Pobřežní mělké vody a zarůstající kanály. Sev. od obce Horný Vek záp. od obce Hurbanovo; Martovce; Lándor pusta sev. od obce Komárno a dále k jihu až k obci Komárno; mezi obcemi Komárno a Chotín (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor, Kolozs majér); mezi železniční stanicí a obcí Chotín; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. roztroušeně (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Radvaň n. D., Moča).

Caltha palustris L. subsp. *cornuta* (Sch., Nym. et K.) Hegi — Bažinatá místa. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesileš, Martovce, Dolný Vek, Komočín, Lándor pusta); Chotín (mezi železniční stanicí a obcí a sev. od obce); mezi obcemi Kravany n. D. a Moča na více místech.

Calystegia sepium (L.) R. Br. — Pobřežní křoviny. Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Dulovce; sz. od obce Modrany; mezi obcemi Modrany a Moča; dvor Slukoviny; Moča.

Campanula bononiensis L. — Suché travnaté stráně. Kóta 212 m sz. od obce Modrany; Novoveské vinice. OSVAČILOVÁ (1956) a FUTÁK (1962): Drieňová hora.

C. glomerata L. subsp. *farinosa* (Kit.) J Á V. — Výslunné stráně. Kóta 212 m a Suchý vrch sev. a sv. od obce Modrany. OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora.

C. sibirica L. subsp. *paniculata* (Opiz) Hendrych — Křovinaté výslunné stráně. Suchý vrch sv. od obce Modrany. OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora; FUTÁK (1962): Modrany, Drieňová hora, Žitavská Tôň.

Cardaria draba (L.) Desv. — Okraje cest a polí. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Carduus collinus W. et K. — Novoveské vinice. Je zajímavé, že druh jsme nenalezli na podobných stanovištích v širším okolí obce Modrany. Na hrázi mezi obcemi Kravany n. D. a Moča jsme nalezli jedinec, který připomínal křížence *Carduus acanthoides* × *collinus* Budai.

C. nutans L. — Suché meze. Dolný Vek; Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolný Peter; Dulovce; mezi obcemi Dulovce a Pribeta; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Radvaň n. D., Moča, Kravany n. D.); Marcelová; Virt; Modrany; Vojnice; Novoveské vinice.

Carlina vulgaris L. subsp. *longifolia* (Rchb.) Arcang. — Výslunné stráně. Sz. od obce Šrobárová; Suchý vrch sv. od obce Modrany. OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora.

Caucalis lappula (WEB.) GRANDE — Pole a úhory. Mezi obcemi Láendor pusta a Komárno; Ďulov dvor; Kolozs majír a Chotín; okolí obce Modrany (Kamenica, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Modrany a Moča.

Celtis occidentalis L. — Introdukovaná dřevina roztroušená v území. Sz. od obce Chotín; sz. od obce Vojnice; mezi kótou Bašov kopec a dvorem Mašan; sev. od obce Virt; u silnice záp. od obce Radvaň n. D. (souvislý hájový porost).

Centaura cyanus L. — Pole. Mezi obcemi Komárno a Láendor pusta; Ďulov dvor; mezi obcemi Iža a Komárno (Harcésas pusta); mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; již. od obce Pribeta; mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; sev. od obce Modrany.

Centaurium pulchellum (Sw.) DRUCE — Vlhká místa u komunikací a slané půdy. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesileš, Horný a Dolný Vek, Martovce, Komočín, Láendor pusta, Komárno); Komárno-tehelňa, mezi obcemi Komárno a Iža (M. Harcsás, Harcsás pusta, kóta 112 m); mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; Domáňovská Pustatina; Močarisko jv. od obce Modrany; sz. od obce Moča; u železniční stanice Chotín. (Det. A. ČVANČARA.)

C. vulgare Raf. subsp. *uliginosum* (W. et K.) Soó — Zamokřené slané půdy. Komárno-tehelňa (na vých. okraji poblíže silnice Komárno – Iža). KRIST (1938); u obce Chotín. (Det. A. ČVANČARA.)

Cerithine minor L. — U cest. Mezi obcemi Martovce a Láendor pusta; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Harcsás, Harcsás pusta, kóta 112 m); mezi obcemi Dulovce a Dolný Peter; mezi obcemi Dulovce a Pribeta; sz. od obce Vojnice; Patince-kúpele; Suchý vrch sv. od obce Modrany; Novoveské vinice.

Chaeorrhinum minus (L.) LGE. — Pole a u cest. Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); u lesa Čenka jz. od obce Dolný Peter; mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; okolí obce Marcelová (Bašov kopec, Domáňovská Pustatina); sev. od obce Virt; Patince-kúpele; Žitavská Tôň.

Chamaepodium officinale (L.) WALLR. — U cest a na návsích. Láendor pusta; Komárno-tehelňa; mezi obcemi Komárno a Iža (kóta 112 m); Iža; Marcelová; Žitavská Tôň; Moča.

Chenopodium ambrosioides L. — U silnice v obci Žitavská Tôň.

C. botrys L. — Ruderální stanoviště v obcích. Komárno-tehelňa; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.

C. hybridum L. — Pole a u cest. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

C. vulvaria L. — Obce. Hurbanovo; Marcelová; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.

Chondrilla juncea L. — Travnaté a křovinaté stráně. Nesvady; Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň. Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

Chrysanthemum corymbosum L. subsp. *corymbosum* — Lesy a křovinaté strane. Kóta 212 m a Suchý vrch sev. a sv. od obce Modrany; Nový les; Chrbát v prostoru mezi obcemi Pribeta a Vojnice.

Cirsium brachycephalum JUR. — Vlhké slané louky. Martovce; Komočín; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; Močarisko jv. od obce Modrany. KRIST (1937d) podává rozbor tohoto druhu na Slovensku a (1940) mapku rozšíření na Slovensku.

Clematis integrifolia L. — Vlhké louky, břehy. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno u řeky Žitavy a Nitry (Sesileš, Horný a Dolný Vek, Martovce, Komočín, Láendor pusta); Ďulov dvor; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Harcésas pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Moča).

C. recta L. — Suché okraje pobřežních křovin podél Dunaje. M. Harcsás; Harcsás pusta; Iža; Patince-kúpele; soutok Žitavy a Dunaje; Radvaň n. D.; Moča; dvor Slukoviny; Kravany n. D.

C. vitalba L. — Lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (lesní cesta u hájovny v Pribetském lese a u kóty Nový les); sz. od obce Vojnice.

Colchicum autumnale L. — Louky a vlhká místa při lesních okrajích. Horný a Dolný Vek; Martovce; Komočín; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí a sev. od obce); Komárno — Iža (Harcésas pusta, kóta 112 m); Patince-kúpele; mezi obcemi Kravany n. D. a Moča na více místech; v lese mezi obcemi Pribeta a Vojnice (u hájovny v Pribetském lese, záp. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát).

Conium maculatum L. — Ruderální stanoviště v obcích. Mezi obcemi Komárno a Láendor pusta; Ďulov dvor; Bohatá; Dolný Peter; sz. od obce Vojnice; jv. od obce Modrany; Radvaň n. D.; Moča.

Consolida orientalis (GAY) SCHROED. — Při silnici mezi obcemi Komárno a Láendor pusta nedaleko kóty 109 v rozsáhlých porostech.

C. regalis GRAY subsp. *regalis* — Plevel v polích v okolí obcí. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo;

Martovec; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Corydalis cava (L.) SCHW. et KOERTE — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (jz. od obce Pribetský dvor, kóta Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Crepis foetida L. subsp. *rheocepholia* (M. B.) ČEL. — Výslunné travnaté stráně. Sz. od obce Šrobárová; okoli obce Modrany (Kamenica, kóta 212 m, při cestě k Suchému vrchu); sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, Veterný vŕšok, kóta 131 m u dvora Mašan, Domáňovská Pustatina, Vŕšok); Suchý vrch sv. od obce Modrany; vinice sz. od obce Vojnice; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. FUTÁK (1962): Modrany, Pribeta, Moča.

Cynodon dactylon (L.) PERS. — Suchá travnatá stanoviště. Mezi obcemi Komárno a Iža (M. Harsás, Haresás pusta); Patince; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. okraj obce Marcelová, Bašov kopec, kóta 131 m u dvora Mašan, Domáňovská Pustatina, Vŕšok); Suchý vrch sv. od obce Modrany; vinice sz. od obce Vojnice; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. FUTÁK (1962): Modrany, Pribeta, Moča.

Datura stramonium L. — Ruderální stanoviště a úhory. Sesileš záp. od obce Hurbanovo; Martovec; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Chotín; Dolný Peter; Dulovce; Imeľ; Modrany; Vojnice; Moča; Kravany n. D.

Descurainia sophia (L.) WEBB. — Ruderální stanoviště nejčastěji v obcích. Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Chotín; Dolný Peter; Dulovce; Pribeta; Marcelová; Bašov kopec jv. od obce Marcelová; Šrobárová; Iža; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.

Dianthus armeria L. — Křovinaté stráně a rozvolněné lesní porosty. Mezi železniční stanicí a obcí Chotín; sz. od obce Šrobárová; Suchý vrch sv. od obce Modrany; les mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, kóta Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

D. pontederae KERN. — Suchá travnaté stráně. Suchý vrch sv. od obce Modrany; paseka sz. od kóty Nový les mezi obcemi Pribeta a Vojnice; Patince-kúpele a již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. KRIST (1937b) a OSVÁČILOVÁ (1956): Drieňová hora. Ve studovaném území je výskyt tohoto druhu poměrně řídký. Taxonomická hodnota jihoslovenských populací je dosud nejasná a vyžadovala by dalšího zevrubného studia. Dominujeme se, že tyto populace nejsou zcela totožné s *D. pontederae* KERN. a není vyloučeno, že se jedná o jiný taxon.

D. serotinus W. et K. — Váté písly a písčitá stanoviště. Sv. od obce Imeľ; Rókalyuk pusta sv. od obce Nesvady; kóta 131 m u dvora Mašan sev. od obce Virt. KRIST (1939): Chotín, Radvaň n. D.; FUTÁK (1962): mezi obcemi Imeľ a Bajč, Žitavská Tôň.

Dictamnus albus L. — Křovinaté stráně a suchá místa v lesích. Jv. okraj lesa poblíž dvora Horáreň záp. od obce Mudroňovo; Suchý vrch sv. od obce Modrany; okraj lesa sz. od obce Vojnice.

Diplotaxis muralis (L.) DC. — Ruderální stanoviště, u cest a v polích. Haresás pusta mezi obcemi Komárno a Iža; Ďulov dvor sv. od obce Komárno; u lesa Čenka mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany (Močodlo, Suchý vrch); Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.; Novoveské vinice.

Doronicum hungaricum (SADL.) RCHB. — Doubrava na sz. svahu kóty Nový les v lesním porostu mezi obcemi Pribeta a Vojnice, ca 230 m n. m. Jedinci se nalézali přiblížně v kruhu o průměru asi 10 m v množství asi 100 kvetoucích jedinců. Nápadný byl výskyt velkého množství exemplářů na poměrně omezeném prostoru. Tato lokalita představuje nepochyběně další nový nález tohoto druhu na jižním Slovensku. Dospod jsou známy ze Slovenska tyto lokality: Zobor u Nitry, Krupinská vrchovina (okolí obce Plášťovce z vrchu Šípka a z kóty 368 m — Trinovský vrch), u obce Poltár v okrese Lučenec a v sev. části Ďarmotských kopečků. Srov. MÁJOVSKÝ et JURKO (1956): 130; SVOBODOVÁ et ŘEHOŘEK (1964): 186; BERTOVÁ (1966): 63—66. Podle písemného sdělení nalezli tento druh botanikové SMEJKAL a VÍCHEREK v květnu 1970 na Kováčovských kopečkách v doubravě při lesní cestě poblíž kóty 345 m nad nádražím Kamenica nad Hronom.

Echinops sphaerocephalus L. — Ruderální místa. Na sev. okraji obce Komárno u městských jatek; Lándor pusta; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. FUTÁK (1962): Drieňová hora.

Eryngium campestre L. — Meze a u cest. Nesvady; Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovec; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

E. planum L. — Poloslané půdy. Lándor pusta sev. od obce Komárno; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (M. Harsás, Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.). KRIST (1937a): u obce Chotín.

Euonymus europaea L. — Křoviny a okraje lesů. Mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (M. Harsás, Haresás pusta, Patince-kúpele, Radvaň n. D., u dvora Slukoviny); u Žitavy záp. od obce Virt; v okolí obce Modrany (Kamenica, Suchý vrch, sz. od obce Vojnice).

E. verrucosa SCOP. — Les mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice). FUTÁK (1962): Novoveské vinice.

Falcaria vulgaris BERNH. — Meze a u cest. Nesvady; Imel; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovee; Komárno; Iža; Chotín; Patince; Pribeta; Dulovee; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Ficus carica L. — Zplanělý při Dunaji na vých. okraji obce Moča.

Galeopsis angustifolia EHRL. — Úpatí kóty Novoveské vinice. Přestože byl tento druh sledován, zjistili jsme jej jen na této jediné lokalitě.

Galium boreale L. — Vlhké louky mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Horný a Dolný Vek, Martovee, Komočín, Láendor pusta); Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); M. Haresás mezi obcemi Komárno a Iža.

G. cruciata (L.) SCOP. — Krvatiné stráně a světlé lesy. Okoli obce Modrany (kóta 212 m a Suchý vrch); les mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice); Novoveské vinice.

G. rubroides L. — Vlhké pobřežní křoviny u Dunaje. Patince-kúpele; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.

G. schultesii VEST — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Chrbát, Nový les). ZAHRADNÍKOVÁ (1967) a HADAČ E. (1969) z území tento druh neuvádějí.

Geranium lucidum L. — Světliny v lesích. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, jz. od obce Pribetský dvor v rozsáhlých porostech, Nový les, Chrbát); jv. od obce Marcelová směrem na obec Virt.

Glaucium corniculatum (L.) RUDOLPH — Zplanělý v okolí obce Modrany (na sev. okraji obce Suchý vrch). FUTÁK (1962); u obce Modrany.

Gratiola officinalis L. — Vlhké louky. Martovee; Komočín; Láendor pusta; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta, Patince-kúpele); mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; Dunajské hony mezi dvorem Slukoviny a obcí Moča; Žitavská Tôň. SKALICKÝ (1965) uvádí na mapě ze studovaného území jen jedinou lokalitu.

Gypsophila muralis L. — Ruderální místa a u cest. Okoli obce Dulovee (Erdö pusta, dvor Lapos, Stará hora a na sev. okraji obce).

G. paniculata L. — Váte písky. V lese sev. od obce Imel; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); hřbitov v obci Chotín; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, kóta 134 m, kóta 121 m, dvor Mašan, vinice u obce Domáňovská Pustatina, sev. od obce Žitavská Tôň); u silnice mezi obcemi Žitavská Tôň a Radvaň n. D. KRIST (1938); na hrázi u obce Kravany n. D., (1939); dvor Balázstag u obce Hurbanovo, písčité pahorky a hřbitov u obce Chotín, dvor Máří u obce Kravany n. D.; FUTÁK (1962); záp. od obce Hurbanovo, Žitavská Tôň.

Helichrysum arenarium (L.) MOENCH — Váte písky. Rókalyuk pusta mezi obcemi Nesvady a Bajč; Bašov kopec jv. od obce Marcelová.

Hibiscus trionum L. — Pole a úhory. Imel; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovee; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovee; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Holosteum umbellatum L. subsp. *glutinosum* (M. B.) NYMAN — Písčité půdy a travnaté stráně. Mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás); Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); mezi obcemi Marcelová a Virt (Bašov kopec, kóta 131 m u dvora Mašan, Veterný vŕšok); okolí obce Modrany (u hřbitova u Suchý vrch). Ve studovaném území převažují jedinci patřící k tomuto poddruhu.

Humulus lupulus L. — Pobřežní křoviny a lesy. Mezi dvorem Kotelnica a Timonovou myslivnu záp. od obce Bajč; při Žitavě vých. od obce Martovee; mezi obcemi Martovee a Láendor pusta; Ďulov dvor sv. od obce Komárno; mezi obcemi Komárno a Žitavská Tôň (Haresás pusta, Iža, Patince-kúpele, soutok Žitavy a Dunaje).

Hydrocharis morsus-ranae L. — Túně a slepá ramena. Komočín mezi obcemi Martovee a Láendor pusta; Žitava záp. od obce Virt. HEJNÝ (1960) uvádí tento druh pouze od dvora Aňala mezi obcemi Nesvady a Nové Zámky a z okolí obce Hurbanovo.

Hyoscyamus niger L. — Ruderální místa a u cest. Dolný Vek; mezi obcemi Láendor pusta a Komárno; mezi obcemi Komárno a Iža (Haresás pusta, M. Haresás); Chotín; Dolný Peter; Dulovee; Patince-kúpele; Močská Pustatina sv. od obce Moča; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.

Hypericum hirsutum L. — Světlé lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (sz. od obce Modrany, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Inula britannica L. — U cest. Nesvady; Imel; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovee; Komárno; Iža; Chotín; Patince; Pribeta; Dulovee; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Iris pseudacorus L. — Břehy vod. U řeky Žitavy a Nitry mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesileš, Horný a Dolný Vek, Martovce, Komočín, Lándor pusta); Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Kolozs majír sv. od obce Komárno; mokřiny sz. od obce Chotín; Močarisko a Veľká dolina mezi obcemi Modrany a Moča; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (M. Haresás, Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Radvaň n. D., Moča, Slukoviny).

I. sibirica L. — Na lukách Komočín mezi obcemi Martovce a Lándor pusta.

Juncus articulatus L. — Zamokřená místa. U řeky Váh sv. od obce Komárno; mezi obcemi Komárno a Iža (Komárno-tehelňa, M. Haresás, Haresás pusta); mezi obcemi Marcelová a Šrobárová a mezi obcemi Radvaň n. D. a Kravany n. D. (Moča, Dunajské hony, dvor Slukoviny).

J. compressus JACQ. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Mezi obcemi Komárno a Iža (Komárno-tehelňa, Haresás pusta, kóta 112 m, Iža); Patince; Žitavská Tôň; u obce Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; mezi obcemi Marcelová a Šrobárová.

J. gerardii LOISEL. — Zamokřená a poloslané půdy. Michalov dvor jz. od obce Hurbanovo; Martovce; Komočín; Lándor pusta; mezi železniční stanicí a obcí Chotín; mezi obcemi Komárno a Iža (Haresás pusta, kóta 112 m, Iža); Patince-kúpele, Srov. mapku KRIST (1940).

J. inflexus L. — Podmáčené půdy v blízkosti cest. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Martovce, Komočín, Lándor pusta); Chotín; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta, Iža); Patince-kúpele.

Jurinea mollis (TORN.) RCHB. — Suchý vrch sv. od obce Modrany ve velkém množství. Na této lokalitě byla značná proměnlivost ve tvaru a velikosti přízemních listů od nedělených až po laločnaté s různě hlubokými zářezy. OSVÁČILOVÁ (1956): Drieňová hora; FUTÁK (1962): Drieňová hora a Novoveský vinice.

Kickxia elatine (L.) DUM. — Pole, Sev. okraj obce Imeľ; mezi obcemi Lándor pusta a Komárno na výše místech; Ďulov dvor sv. od obce Komárno; u lesa Čenka mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; Močská Pustatina sz. od obce Moča.

K. spuria (L.) DUM. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; jv. od obce Modrany. FUTÁK (1962): okolí obce Modrany. Na několika místech jsme nalezli jedinice (Patince, Moča), připomínající křížence mezi oběma zmíněnými druhy.

Lactuca quercina L. subsp. *quercina* var. *quercina* — Prosvětlené háje. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi obcemi Pribeta a Vojniece (Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojniece); Novoveský vinice. FERÁKOVÁ (1969) uvádí nejbližší lokality tohoto taxonu ve vztahu ke studovanému území od obce Čenkov a k zóne Drieňová hora.

L. serriola (L.) TORN. — Výslunné stráně. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Komárno; Iža; Chotín; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojniece; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Lamium amplexicaule L. — Pole a vinice. Imeľ; Bohatá; Hurbanovo; Chotín; Komárno; mezi obcemi Hurbanovo a Dolný Peter (Veľká Kamenná Pustatina, Malá Kamenná Pustatina); Marcelová; Virt; Žitavská Tôň; Modrany.

L. purpureum L. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Chotín; mezi obcemi Hurbanovo a Dolný Peter (Veľká a Malá Kamenná Pustatina); mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, Domáňovská Pustatina); Virt; Žitavská Tôň; mezi obcemi Modrany a Moča (Veľká dolina, Močská Pustatina).

Lappula myosotis MORECH. — Pole a úhory. Chotín; Dulovce; mezi obcemi Komárno a Iža (Komárno-tehelňa, Haresás pusta); Horáreň sz. od obce Šrobárová; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, Domáňovská Pustatina); Virt; Suchý vrch sv. od obce Modrany; mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Veľká dolina, Močská Pustatina); sv. od obce Vojniece; Novoveský vinice.

Lapsana communis L. — Ruderální stanoviště. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; Dulovce; Marcelová; Šrobárová; Moča.

Lathyrus niger (L.) BERNH. — Prosvětlená místa v lese mezi obcemi Pribeta a Vojniece (jz. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojniece).

L. tuberosus L. — Okraje polí a cest. Nesvadby; Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojniece; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Leucocjum aestivum L. — Bažinaté louky a zaplavovaná místa v širokém pobřeží Dunaje. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno při řece Žitavě a Nitře (Sesileš, Horný a Dolný Vek, Martovce, Komočín, Lándor pusta); na některých místech ještě v rozsáhlých porostech, zejména při silnici z obce Horný Vek do obce Martovce; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň); na těchto lokalitách velmi roztroušeně a netvoří velké porosty. KRIST (1938): Iža.

Linaria vulgaris L. — Okraje polí a výslunné křovinaté stráně. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurba-

novo; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Linum flavum L. subsp. *flavum* — Výslunné travnaté stráně. Suchý vrch sv. od obce Modrany. OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora.

L. hirsutum L. subsp. *latifolium* (LEDEB.) DOST. — Travnaté výslunné stráně. Sz. od obce Šrobárová (již. od dvora Horáreň); Suchý vrch sv. od obce Modrany; Novoveské vinice. OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora; FUTÁK (1962): Modrany.

L. tenuifolium L. — Suchá travnatá místa. Sz. od obce Šrobárová; kóta 212 m a Suchý vrch sev. a sv. od obce Modrany; Novoveské vinice; Kravany n. D. (záp. při Dunaji). OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora; FUTÁK (1962): Modrany a Novoveské vinice.

Lithospermum arvense L. — Pole a úhory. Imel; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

L. purpureo-coeruleum L. — Háje a křovinaté stráně. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (u obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Modrany a sz. od obce Vojnice); u kóty 212 m sev. od obce Modrany; Suchý vrch sv. od obce Modrany; Novoveské vinice. FUTÁK (1962): Novoveské vinice a Drieňová hora.

Lotus tenuis W. et K. — Poloslané půdy podél řeky Dunaje. Mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, Haresás pusta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele); mezi obcemi Kravany n. D. a Moča u dvora Slukoviny. Srov. mapku KRIST (1940). *Lotus borbási* UJHELYI, který je znám z Novoveských vinic, jsme ve studovaném území nepozorovali.

Lupinus polyphyllus LINDL. — Vysávaný v lesích. U hájovny v Pribetském lese; Nový les sz. od obce Vojnice.

Lythrum hyssopifolium L. — Poloslané půdy. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesileš, Dolný a Horný Vek, Martovce, Komočín, Láendor pusta, Komárno); Komárno-tehelňa; mezi obcemi Komárno a Iža (Haresás pusta, kóta 112 m); mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; Domáňovská Pustatina; Močarisko jv. od obce Modrany; sz. od obce Moča; u železniční stanice Chotín. Druh roste většinou společně s druhem *Centaurium pulchellum* (Sw.) DRUCE.

L. virgatum L. — Vlhké louky a pobřežní křoviny. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesileš, Horný Vek, Martovce, Komočín, Láendor pusta, Komárno-jatky); Ďulov dvor; Kolozs majír; sv. od obce Komárno; mezi železniční stanici a obec Chotín; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Moča, Kravany n. D.); Velká dolina mezi obcemi Modrany a Moča.

Malcolmia africana (L.) R. BR. — U cest druhotně rozšířená. Mezi obcemi Komárno a Patince-kúpele (M. Haresás, Komárno-tehelňa, Haresás pusta, kóta 112 m, Iža). KRIST (1939): nedaleko obce Iža.

Malva silvestris L. — U cest, v křovinách. Mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, M. Haresás, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Radvaň n. D., Kravany n. D.); Marcelová; Šrobárová; Modrany.

Matricaria chamomilla L. — Úhory, pole a u cest. U železniční stanice Hurbanovo; Martovce; sv. od obce Chotín; Dulovce; Modrany; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta); Žitavská Tôň; Moča. Mezi obcemi Komárno a Iža u kóty 112 m byli na poloslaných půdách jedinci, kteří svým vzhřustum odpovídali populaci *M. chamomilla* L. subsp. *bayeri* (KAN.) HAY.

M. discoidea DC. — U cest a v obcích. Imel; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Láendor pusta; Komárno; Chotín; Dolný Peter; Pribeta; Iža; Patince; Radvaň n. D.; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Kravany n. D.; Novoveské vinice.

Medicago minima (L.) GRUBBG. — Výslunné travnaté stráně. Sv. od obce Imel; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; mezi železniční stanici a obec Chotín; stráně sv. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany (sev. od obce a Suchý vrch); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (souvisle od obce Marcelová po Bašov kopec, dvor Mašan, Veterný vříšok, sz. od obce Radvaň n. D.); již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. FUTÁK (1962): Moča a vinice u obce Nová Vieska.

Melandrium noctiflorum (L.) FR. — Pole a úhory. Láendor pusta sev. od obce Komárno; sv. od obce Komárno (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor, Kolozs majír); mezi obcemi Chotín a Dolný Peter (les Čenka); mezi obcemi Marcelová a Virt (jv. okolí obce Marcelová a Šrobárová); mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Velká dolina, Močská Pustatina); Žitavská Tôň.

M. viscosum (L.) ČELAK. — Travnaté stráně. Kóta 118 m sv. od obce Virt; mezi obcemi Močská Pustatina a Moča; mezi obcemi Moča a Kravany n. D. OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora.

Melilotus albus DESR. — Příkopy a rumiště. Láendor pusta sev. od obce Komárno; sv. od obce Komárno (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor; Kolozs majír); mezi obcemi Komárno a Iža (Haresás

pusta, kóta 112 m); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. okraj obce, Bašov kopec, kóta 131 m u dvora Mašan, Veterný vršok, Virt, sev. od obce Žitavská Tôň); Moča.

M. officinalis (L.) LAM. — Na podobných stanovištích jako u předešlého druhu. Nesvady; Imel; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovec; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

Mercurialis annua L. — Okraje polí zejména v obcích. Hurbanovo; Martovce; Láendor pusta sev. od obce Komárno; Komárno; Chotín; Dolný Peter; Pribeta; Komárno-tehelňa; Haresás pusta mezi obcemi Komárno a Iža; Patince; Patince-kúpele; Radvaň n. D.; Marcelová; Modrany; Vojnice.

Misopates orontium (L.) RAF. — Pole. Na sev. okraji obce Modrany a sv. od obce Vojnice.

Mycelis muralis (L.) DUM. — Lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (u obce Pribetský dvor, Pribetský les, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Nigella arvensis L. — Travnaté svahy, okraje polí a úhory. Sv. od obce Imel; mezi obcemi Nesvady a Bajč (Rókalyuk pusta, Timonova myslivna, dvor Kotelnica); na hrázi mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Horný Vek, Martovce, Láendor pusta); sv. od obce Komárno (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor, Kolozs majír); mezi železniční stanicí a obcí Chotín; u lesa Čenka mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; vinice mezi obcemi Dolný Peter a Dulovec; mezi obcemi Hurbanovo a Dulovec (Vinohrady, Veľká Kamenná Pustatina, Malá Kamenná Pustatina); okolí obce Dulovec (Stará hora, Lapos); mezi obcemi Komárno a Iža; (M. Haresás, Haresás pusta); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. souvisle (Bašov kopec, dvor Mašan, Veterný vršok, Virt, Žitavská Tôň); mezi obcemi Dolný Peter a Šrobárová (vrch Kurta, dvor Horáren, Žltý dom); okolí obce Modrany (Kamenica, kóta 212 m, Suchý vrch); sz. a sv. od obce Vojnice; mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Veľká dolina, Močská Pustatina); mezi obcemi Moča a Kravany n. D. (Dunajské hony a dvor Slukoviny). MÁJOVSKÝ (1961); Marcelová; FUTÁK (1962): Modrany a Drieňová hora; SVOBODOVÁ (1966a); Vojnice.

Nonea pulla (L.) DC. — Suché meze a stráně. Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovec; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

Onopordum acanthium L. — Náspy, pustá místa, rumiště. Nesvady; Imel; Bajč; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); Dolný Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, kóta 112m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.); Modrany; Vojnice; Búč; Nová Vieska.

Oryzopsis virescens (TRIN.) BECK — Okraj lesa již. od kóty Nový les sev. od obce Modrany.

Padus serotina (EHRH.) BORKH. — Vysazován v lesích mezi obcemi Pribeta a Vojnice (les u Pribetského dvora, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Papaver rhoeas L. — Pole a úhory. Martovce; Láendor pusta; sv. od obce Komárno (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor); mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany; sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Modrany a Moča na výco místech.

Petroselinum proliferum (L.) P. W. BALL et HEYWOOD — Travnaté výslunné stráně. Sv. od obce Imel; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; dvor Kotelnica sz. od obce Bajč; Chotín; Iža; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. okraj obce, Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tôň); stráně sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany (sev. od obce, kóta 212 m, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; Močská Pustatina sz. od obce Moča; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.

Peucedanum alsaticum L. — Výslunné křovinaté stráně. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany (kóta 212 m, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; v lese mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, Nový les, Chrbát); Novoveské vinice. OSVÁČILOVÁ (1956) a FUTÁK (1962): Drieňová hora.

P. oreoselinum (L.) MOENCH — Písčité půdy. Mezi železniční stanicí a obcí Chotín; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, kóta 131 m u dvora Mašan, sev. od obce Žitavská Tôň).

Phytolacca americana L. — Křoviny. Jíž. část lesů při jv. okraji obce Marcelová; mezi kótou Bašov kopec a dvorem Mašan sv. od obce Virt.

Plantago altissima L. — Vlhké louky. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Dolný Vek, Martovce, Komočín, Láendor pusta); sv. od obce Komárno (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor); mezi železniční stanicí a obcí Chotín; na loukách při Dunaji mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Moča, dvor Slukoviny).

P. indica L. — Písčiny. Mezi železniční stanicí a obcí Chotín; les Čenka mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; u silnice vých. od obce Dulovce; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce Marcelová, Bašov kopeč, dvor Mašan, Veterný víšok, Domáňovská Pustatina, sev. od obce Žitavská Tôň); písčiny mezi obcemi Modrany a Moča. FUTÁK (1962): písčiny u obce Modrany.

Polygonatum latifolium (JACQ.) DESF. — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les u obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Modrany, sz. od obce Vojnice); Novoveské vinice. FUTÁK (1962): Drieňová hora.

P. multiflorum (L.) ALL. — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Polygonum amphibium L. — Tůně a slepá ramena podél řeky Nitry, Dunaje a Žitavy. Láendor pusta; sev. okraj obce Komárno; Komárno-tehelňa; mezi obcemi Komárno a Iža (Haresás pusta); Patince; Patince-kúpele.

Portulaca oleracea L. subsp. *silvestris* (DC.) ČEL. — Costy, úhory a vinice, často jako obtížný plevel. Nesvady; Imel; Bajč; Hurbanovo; Dolný a Horný Vek; Martovce; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolný Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, kóta 112 m, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Moča, dvor Slukoviny); Modrany; Vojnice; Nová Vieska.

Prunella laciniata (L.) NATHU. — Travnaté porosty na sev. okraji obce Moča; Novoveské vinice. FUTÁK (1962): Modrany, Drieňová hora.

P. vulgaris L. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesileš, Láendor pusta); Dulovce; Dolný Peter; Pribeta; mezi obcemi Komárno a Patince (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele); Modrany; Moča.

Pulmonaria mollissima KERN. — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (již. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice). FUTÁK (1962): Drieňová hora.

P. officinalis L. subsp. *officinalis* — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Nový les, Chrbát).

Ranunculus arvensis L. — Pole. Mezi železniční stanicí a obcí Chotín; u lesa Čenka jz. od obce Dolný Peter; mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; okolí obce Modrany (sev. okraj obce, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; Močská Pustatina sz. od obce Moča.

R. illyricus L. — Prosvětlené lesy. Les Čenka jz. od obce Dolný Peter; již. od obce Velká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; stráň sz. od obce Šrobárová; Nový les sev. od obce Modrany. FUTÁK (1962): Drieňová hora.

R. sceleratus L. — Mokřiny a příkopy u cest. Martovce; Komočín mezi obcemi Martovce a Láendor pusta; Komárno-tehelňa; mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; na okraji lesa sev. od obce Modrany; Podunaj-ké hony mezi obcemi Moča a Kravany n. D.

Reseda lutea L. — Meze a u cest. Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

R. luteola L. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Láendor pusta sev. od obce Komárno; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; sz. od obce Šrobárová; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Suchý vrch, Patince, Žitavská Tôň); Vojnice.

R. phyteuina L. — V území jen podél toku Dunaje, převážně na hrázích. Komárno-tehelňa; M. Haresás; Haresás pusta; kóta 112 m; Iža; mezi obcemi Iža a Patince; Patince-kúpele; Veterný víšok u obce Virt; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.; Kravany n. D.

Scleria aethiopis L. — Travnaté výslunné stráně a úhory. Mezi dvory Horáreň a Žltý dom sz. od obce Šrobárová; Suchý vrch sv. od obce Modrany; sev. od kóty 212 m u obce Modrany. KRIST (1939): vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo.

S. austriaca JACQ. — Travnatá místa. U hřbitova vých. od obce Radvaň n. D.; u silnice mezi obcemi Búč a Kravany n. D. (dvor Červený Písek). OSVÄČILOVÁ (1956): Drieňová hora; FUTÁK (1962): záp. od obce Pribeta.

S. nemorosa L. — Meze a u cest. Bajč; Bohatá; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komočín; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Hurbanovo; Dolný Peter; Dulovce; mezi obcemi Marcelová a Žitavská Tôň (Bašov kopeč, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt); mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.); Šrobárová; Modrany; mezi obcemi Pribeta a Vojnice; Nová Vieska.

S. pratensis L. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Martovce; Láendor pusta sev. od obce Komárno; Dulovce; Modrany; Komárno-tehelňa; Iža; Patince; Kravany n. D.; Moča.

S. verticillata L. — Travnatá místa. Dvor Kotelnica sz. od obce Bajč; Láendor pusta sev. od obce Komárno; sz. od obce Vojnice; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.; Kravany n. D.

Sambucus ebulus L. — Ruderální stanoviště a okraje lesů. Nesvady; Imel; Bajč; Hurbanovo; Dolný a Horný Vek; Martovce; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolný

Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.); Modrany; Vojnice; Nová Vieska.

Saponaria officinalis L. — Druhotná stanoviště ve vsích a u cest. Martovce; Láendor pusta sev. od obce Komárno; mezi obcemi Hurbanovo a Dolný Peter (Vefká a Malá Kamenná Pustatina); mezi železniční stanicí a obec Chotín; Komárno-tehelňa; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; Dulovec; mezi obcemi Marcelová a Žitavská Tôň (dvor Mašan, Domáňovská Pustatina); Moča.

Saxifraga bulbifera L. — Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo.

Sclerochloa dura (L.) BEAUV. — Seslapávaná města na cestách. Sesleš záp. od obce Hurbanovo; Bajč; Horný Vek; Láendor pusta sev. od obce Komárno; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; mezi obcemi Hurbanovo a Dolný Peter (Vefká Kamenná Pustatina); Pribeta; mezi obcemi Marcelová a Virt (jv. okraj obce, Bašov kopee, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina); sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany; sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Komárno a Radvaň n. D. (M. Haresás, Haresás pusta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň); mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Vefká dolina, Močská Pustatina).

Senecio paludosus L. subsp. *angustifolius* HOLUB — Stojaté vody a pobřežní kroviny při říčních tocích. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Martovce, souvisle přes obec Komočín, Láendor pusta až k obci Komárno); mezi obcemi Komárno a Žitavská Tôň (Haresás pusta, M. Haresás, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň). Všechny rostliny ze sledovaného území jsou po stránce morfologické jednotného charakteru (srov. HOLUB 1962).

S. viscosus L. — Písčitá a někdy druhotná stanoviště. Sv. od obce Imel; železniční stanice Bajč; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. okraj obce Marcelová, Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt).

Serratula tinctoria L. — Vlhké louky. Komočín mezi obcemi Martovce a Láendor pusta; jv. od obce Láendor pusta; Komárno (sv. okraj města); Haresás pusta mezi obcemi Komárno a Iža; Patince-kúpele.

Sideritis montana L. — Travnaté porosty a písčité půdy. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; stráňky mezi dvory Horáreň a Žltý dom; sz. od obce Šrobárová; kóta 212 m a Suchý vrch v okolí obce Modrany; sz. od obce Vojnice; dvor Mašan a Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; Močská Pustatina sz. od obce Moča; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. KRIST (1937e); Chotín; FUTÁK (1962); Modrany a Drieňová hora.

Silene borysthenica (GRUNER) S. M. WALTERS — Zatravnělé váté písky. Mezi obcemi Nesvady a Bajč (Rókalyuk pusta); mezi obcemi Marcelová a Virt (Bašov kopec, kóta 131 m u dvora Mašan sv. od obce Virt). (Det. M. ŠOURKOVÁ.)

S. conica L. — Písčité půdy. Sv. od obce Imel (Rókalyuk pusta, vých. od obce Nesvady); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. plynule, např. Bašov kopec, dvor Mašan, Veterný vršok, Domáňovská Pustatina atd.; mezi železniční stanicí a obec Chotín; pískoviště záp. od obce Dolný Peter. KRIST (1938); Chotín, (1939); Hurbanovo, majír Balázstag, vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; Chotín, dvor Mária u obce Kravany n. D.; FUTÁK (1962); Moča.

S. dichotoma EHRH. — Pole a úhory. Láendor pusta sev. od obce Komárno; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; okolí obce Modrany (Suchý vrch, na sev. okraji obce); mezi obcemi Šrobárová a dvorem Horáreň; sv. od obce Vojnice; Novoveské vinice; mezi obcemi Komárno a Patince (Haresás pusta, M. Haresás, Iža, Patince); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, Veterný vršok, Virt, sev. od obce Žitavská Tôň).

Sium latifolium L. — Tůně a vlhké příkopy. Martovce; Komočín; Láendor pusta sev. od obce Komárno; Ďulov dvor sv. od obce Komárno; mezi železniční stanicí a obec Chotín; mezi obcemi Komárno a Iža (Komárno-tehelňa, Haresás pusta).

Solanum dulcamara L. — Pobřežní kroviny a krovinaté stráně. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesleš, Horný a Dolný Vek, Martovce, Komočín, Láendor pusta, Komárno-jatky); sev. od obce Chotín; Dulovec; již. od obce Domáňovská Pustatina; mezi obcemi Komárno a Patince (Haresás pusta, Iža); Suchý vrch a u hřbitova v obci Modrany. Rostliny na posledních dvou lokalitách jsou sbírány z výslunných suchých stanovišť a jsou nápadně mnohem užšími listy než z vlhkých stanovišť. Tyto úzkolisté populace si vyžadují dalšího taxonomického studia a není vyloučeno, že se jedná o odlišné taxóny.

Sonchus arvensis L. — Pole a úhory. Komárno-tehelňa; Ďulov dvor sv. od obce Komárno; Chotín; Marcelová; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce, Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tôň, Radvaň n. D.); mezi obcemi Modrany a Búč; sz. od obce Vojnice; Podunajské hony vých. od obce Moča.

Stachys annua L. — Pole a úhory. Nesvady; Imel; Bajč; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolný Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, kóta 112 m, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Moča, dvor Slukoviny); Modrany; Vojnice; Nová Vieska.

S. germanica L. — Krovinaté a travnaté stráně. Imel; u dvora Kotelnice sz. od obce Bajč; na

hrázi řeky Nitry při lukách Komočín mezi obcemi Martovce a Láendor pusta; sz. od obce Šrobárová; na sev. okraji obce Modrany; sz. od obce Vojnice; Novoveské vinice; Radvaň n. D.

Tanacetum vulgare L. — Druhotná stanoviště. Nesvady; Imel'; Bajč; Hurbanovo; Horný a Dolní Vek; Martovce; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); Dolní Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pesta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.); Modrany; Vojnice; Búč; Nová Vieska.

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth — Vlhké louky. Martovce; při silnici mezi železniční stanicí a obcí Chotín; při Dunají mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, Haresás pesta, M. Haresás, Iža, Patince, Patince-kúpele, již. od obce Marcelová při Žitavě, Žitavská Tôň, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.).

Thalictrum flavum L. subsp. *flavum* — Vlhké louky. Timonova myslivna záp. od obce Bajč; Martovce; Komočín; Láendor pusta; Komárno-jatky; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Moča; Kravany n. D.

Thlaspi perfoliatum L. — Výslunné stránč, úhory. Nesvady; Imel'; Bajč; Hurbanovo; Horný a Dolní Vek; Martovce; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolní Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pesta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Moča, dvor Slukoviny); Modrany; Vojnice; Nová Vieska.

Thymelaea passerina (L.) Coss. et GERM. — Výslunné travnaté stránč. Mezi obcemi Dolní Peter a Dulovce; okolí obce Dulovce (Stará hora, dvor Lapos, Podháj); vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi dvorem Horáreň a obcí Šrobárová; kóta 212 m a vinice sev. od obce Modrany. KRIST (1939); Radvaň n. D.; FUTÁK (1962): Žitavská Tôň a Modrany.

Tithymalus cyprissias (L.) Scop. — Meze, u cest a písčité půdy. Sv. od obce Imel'; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; Bohatá; Hurbanovo; Chotín; les Čenka mezi obcemi Chotín a Dolní Peter (Veľká Kamenná Pustatina); Dulovce; Pribeta; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, M. Haresás, Haresás pesta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Radvaň n. D., Moča, Kravany n. D.); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce, Bašov kopeč, dvor Mašan, Veterný vršok, Domáňovská Pustatina, Virt); mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Močská Pustatina); Vojnice, Novoveské vinice.

T. esula (L.) SCOP. — Travnaté porosty. Martovce; Komočín; Láendor pusta sev. od obce Komárno; železniční stanice Chotín; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, M. Haresás, Patince, Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.).

T. exiguum (L.) LAM. — Pole. Mezi obcemi Komárno a Láendor pusta; mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; Močodla a Močská Pustatina mezi obcemi Modrany a Moča; sv. od obce Vojnice.

T. fulcatus (L.) KLOTZSCH et GARCKE — Pole. Nesvady; Imel'; Bajč; Hurbanovo; Dolní a Horný Vek; Martovce; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolní Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pesta, kóta 112 m, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tôň, Moča, dvor Slukoviny); Modrany; Vojnice; Nová Vieska.

T. glareosus (PALLAS ex BIEB.) PROCH. subsp. *pannonicus* (HOST) CHRTEK et KŘÍSA — Travnaté meze podél silnic. Sz. okraj obce Mudroňovo asi 1,5 km od obce; obec Šrobárová u silnice na sv. okraji obce. KRIST (1939); u obce Šrobárová; FUTÁK (1962): Novoveské vinice.

T. helioscopia (L.) SCOP. — Pole a ruderální stanoviště. Bajč; Hurbanovo; Martovce; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; mezi obcemi Komárno a Patince (Haresás pesta, kóta 112 m, Iža); Marcelová; Virt; Žitavská Tôň; Modrany; Vojnice.

T. lucidus (W. et K.) KLOTZSCH et GARCKE — Pobřežní kroviny a okraje tůní. Mezi obcemi Martovce a Láendor pusta plynule; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Iža; Patince; Patince-kúpele.

T. palustris (L.) HAW. — Stojaté vody a okraje tůní. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesileš, Horný Vek, Martovce, Komočín, Láendor pusta, při sev. okraji obce Komárno); mezi obcemi Komárno a Žitavská Tôň (Komárno-tehelňa, Haresás pesta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitava záp. od obce Virt).

T. platyphyllus (L.) RAFIN. subsp. *platyphyllus* — Pole a druhotná stanoviště. Imel': Láendor pusta; Hurbanovo; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, Iža, Patince, Žitavská Tôň, Radvaň n. D., Moča); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce, Bašov kopeč, Veterný vršok, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt).

T. salicifolius (HOST) KLOTZSCH et GARCKE — Travnaté porosty a krovinaté suché stránč. Mezi dvorem Horáreň a obcí Šrobárová; okolí obce Modrany (kóta 212 m, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; u široké lesní cesty nedaleko kóty Nový les sev. od obce Modrany. KRIST (1937b): Drieňová hora; FUTÁK (1962): Drieňová hora a Novoveské vinice.

T. sequelianus (NECK.) PROCH. subsp. *sequelianus* — Váté písky a travnaté výslunné porosty. Sv. od obce Imel'; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); sz. od obce Šrobárová; Suchý vrch sv. od obce Modrany; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Iža, Patince-kúpele, Radvaň n. D., dvor Slukoviny, Kravany n. D.); mezi obcemi Marcelová a Žitavská Tôň (jv. od obce, Bašov kopeč, dvor Mašan, Veterný vršok, Domáňovská

Pustatina, u obce Virt), KRIST (1937b) a OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora; KRIST (1937c): Chotín; FUTÁK (1962): Žitavská Tôň, Modrany, Drieňová hora.

T. virgatus (W. et K.) KLOTZSCH et GARCKE — Meze a stráně s travnatými porosty. Láendor pusta sev. od obce Komárno; mezi železnici stanicí a obcí Chotín; u lesa Čenka mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; vinice mezi obcemi Dolný Peter a Dulovec; stráně mezi dvorem Horáreň a obcí Šrobárová; okolí obce Modrany (kóta 212 m, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; Iža; Patince; Marcelová; Virt; Žitavská Tôň.

Tragopogon dubius SCOP., subsp. *mijor* (JACQ.) VOLLM. — Výslunné stráně. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; sz. od obce Šrobárová; mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta); okolí obce Modrany (sev. od obce, kóta 212 m, Suchý vrch); sv. obce Vojnice; Novoveské vinice; mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Močská Pustatina); mezi obcemi Kravany n. D. a Moča. OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora.

Trifolium arvense L. — Úhory a písčité půdy. Sv. od obce Imel; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; Timonova myslivna mezi obcemi Nesvady a Bajč; Chotín; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce, Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tôň).

Valerianella mitra (L.) DUF. — Travnaté porosty. U řeky Žitavy záp. od obce Virt; sev. od obce Žitavská Tôň (u lesa). HADAČ et CHRTEK (1968) uvádějí tento druh z Podunajské nížiny nejbližší od obce Čenkov.

V. olitoria (L.) POLL. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu a na úhorech. Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovec; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo, Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Bút; Nová Vieska.

Verbena officinalis L. — Meze, pastviny, rumiště. Nesvady; Imel; Bajč; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; Dúlov dvor; Chotín (mezi železnici stanicí a obcí); Dolný Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D.; Modrany; Vojnice; Bút; Nová Vieska.

Veronica longifolia L. — Křoviny na vlhkých lukách. Komočín mezi obcemi Martovce a Láendor pusta.

V. prostrata L. — Výslunné stráně. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi dvorem Horáreň a obcí Šrobárová; okolí obce Modrany (kóta 212 m, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Patince a Kravany n. D. (Patince-kúpele, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.).

V. serpyllifolia L. — Vlhké louky, u cest a v lesích. Dolný Vek; Komočín; Láendor pusta; Komárno-tehelňa; sev. od obce Chotín; mezi obcemi Dulovec a Pribeta; mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Vicia pannonica Cr. — Travnatá místa u cest. Martovce; Láendor pusta; v okolí obce Modrany (kóta 212 m a u hřbitova); Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; Močská Pustatina sz. od obce Moča.

V. pisiformis L. — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice). KRIST (1937b) a FUTÁK (1962): Drieňová hora.

V. striata M. B. — Travnatá místa. Sz. od obce Šrobárová; mezi obcemi Modrany a kótou Suchý vrch.

Vinca herbacea W. et K. — Křovinaté stráně a světlé háje. Mezi dvorem Horáreň a obcí Šrobárová; okolí obce Modrany (kóta 212 m, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; světlá místa u cest v lesích u kót Nový les.

Xeranthemum annuum L. — Výslunné travnaté stráně. Mezi obcemi Imel a Bajč (sv. od obce, Rókalyuk pusta, Timonova myslivna); Chotín, Dolný Peter; okolí obce Dulovec (Stará hora, dvor Lapos); vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi dvorem a obcí Šrobárová; okolí obce Modrany (Karmenica, kóta 212 m, Suchý vrch); mezi obcemi Šrobárová a Modrany; mezi obcemi Modrany a Vojnice; sz. od obce Vojnice; Novoveské vinice; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce, Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tôň).

Literatura

BERTOVÁ L. (1966): Príspevok k rozšíreniu *Doronieum hungaricum* Rehb. na Slovensku. — *Acta Bot. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov.*, Bratislava. 12/1 : 63—66.

DOSTÁL J. (1960): The phytogeographical region distribution of the Czechoslovak flora. — *Sborn. Čs. Společ. Zeměp.*, Praha, 65 : 193—202.

FERÁKOVÁ V. (1969): Rozšírenie druhu *Lactuca quercina* L. v Československu. — *Zpr. Čs. Bot. Společ.*, Praha, 4 : 145—154.

FUTÁK J. (1962): Floristické poznámky z juhovýchodnej časti Západoslovenského kraja. — *Sborn. Pr. Ochr. Prírody Západoslov.* Kr., Bratislava, 1962 : 35—50.

- (1966): Fytogeografické členenie Slovenska. — In: FUTÁK J. [red.]: Flóra Slovenska. 1, p. 535—538. — Bratislava.
- HADAČ E. (1969): The distribution of *Galium silvaticum* L. and *G. Schultesii* Vest in Czechoslovakia. — Preslia, Praha, 41 : 39—60.
- HADAČ E. et J. ČIRTEK (1968): *Valerianella mixta* (L.) Dufr. v Československu. — Preslia, Praha, 40 : 301—303.
- HEJNÝ S. (1960): Ökologische Charakteristik der Wasser- und Sumpfpflanzen im dem slowakischen Tiefebenen. — Bratislava.
- HENDRYCH R. (1968): Ad floram regionis Filakoviensis in Slovacia addenda critica. — Acta Univ. Carol. Biol., Praha, 1967 : 109—183.
- HOLUB J. (1962): Beitrag zur Taxonomie der Art *Senecio paludosus* L. — Novit. Bot. Hort. Bot. Univ. Carol. Prag., Praha, 1962 : 25—34.
- HOLUBOVÁ A. et Z. SLAVÍKOVÁ (1964): *Aristolochia clematitis* na území ČSSR. — Preslia, Praha, 36 : 294—305.
- KNAPP J. (1864): Correspondenz. — Österr. Bot. Zeitschr., Wien, 14 : 221.
- KRIST V. (1937a): Floristické poznámky z jižního a jihozápadního Slovenska. — Sborn. Klubu Přírod. Brno 19 (1936) : 50—57.
- (1937b): Dvě zajímavé lokality teplobytné květeny na jižním Slovensku. — Příroda, Brno, 30 : 13—16.
- (1937c): Příspěvek ke květeně písků na jižním Slovensku. — Příroda, Brno, 30 : 293—297.
- (1937d): Příspěvek k poznání květeny československé II. — Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, 238 : 1—17.
- (1938): Floristické poznámky ze Slovenska II. — Sborn. Klubu Přírod. Brno 20 (1937) : 24 až 30.
- (1939): Floristické poznámky ze Slovenska III. — Sborn. Klubu Přírod. Brno 21 (1938) : 40 až 47.
- (1940): Halofytiní vegetace jihozápadního Slovenska a severní části Malé uherské nížiny. — Pr. Mor. Přírod. Společ., Brno, 12/10 : 1—100.
- MÁJOVSKÝ J. (1961): *Cycloloma platyphyllum* (Michx.) Moq. a *Amarantus blitoides* S. Wats., dva nové druhy flóry Slovenska. — Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen., Bot., Bratislava, 6 : 391—405.
- MÁJOVSKÝ J. et A. JURKO (1956): Asociácia *Festuca pseudodalmatica*-*Inula oculus christi* na južnom Slovensku. — Biológia, Bratislava, 11 : 129—145.
- OSVAČILOVÁ V. (1956): Sukcesia na opustených viniciach juhozápadného Slovenska. — Biológia, Bratislava, 11 : 416—423.
- SCHILLER S. (1865): Aus Oberungarn. — Österr. Bot. Zeitschr., Wien, 15 : 378—383.
- SKALICKÝ V. (1959): Einige taxonomische und phytogeographische Bemerkungen zu den tschechoslowakischen Arten der Gattung *Anthericum* L. — Acta Univ. Carol.-Biol., Praha, 1959 : 117—157.
- (1965): *Gratiola officinalis* L. in der Tschechoslowakei mit einigen Bemerkungen zur phytogeographischen Gliederung der Tschechoslowakei. — Preslia, Praha, 37 : 289—298.
- SOÓ R. (1968): A magyar flóra és vegetáció rendszertani növényföldrajzi kézikönyve. 3. — Budapest.
- STARÝ F. (1952): Farmakobotanická monografia *Adonis vernalis* L. — Preslia, Praha, 24 : 3—40.
- SVOBODOVÁ Z. (1966a): Nové lokality a rozšírenie niektorých adventívnych rastlín, ruderálov a burín. — Acta Fytotechnica Univ. Agricult. Nitra 13 : 171—175.
- (1966b): Nové lokality a rozšírenie niektorých lúčnych a močaristých druhov rastlín. — Acta Fytotechnica Univ. Agricult. Nitra 14 : 181—186.
- SVOBODOVÁ Z. et V. ŘEHOŘEK (1964): Príspevok k flóre povodia Ipľa. — Acta Fytotechnica Univ. Agricult. Nitra 10 : 183—190.
- ZAHRADNÍKOVÁ K. (1967): Príspevok k rozšíreniu *Galium silvaticum* L. a *G. schultesii* Vest. — Biológia, Bratislava, 22 : 132—142.

Došlo 12. ledna 1971
Recenzenti: V. Jirásek, V. Řehořek