

Sambucetum ebuli a iné ruderálne spoločenstvá v meste Trnave

Sambucetum ebuli and other ruderal communities in Trnava town

Pavol Eliáš

ELIÁŠ P. (1978): *Sambucetum ebuli a iné ruderálne spoločenstvá v meste Trnave* [*Sambucetum ebuli and other ruderal communities in Trnava town.*] — Preslia, Praha, 50 : 225—252.

Ruderal plant communities in Trnava town (SW. Slovakia, Czechoslovakia) have been investigated. Five spring ephemeral communities of the alliances *Sisymbrium* and *Polygonion* were described in a previous paper. This paper contains a phytocenological analysis of further 12 important syntaxa of ruderal vegetation based on 110 relevés. It describes species composition, synmorphology, synchrology, synecology and variability of the associations of the alliances *Sisymbrium* (6 communities), *Convolvo-Agropyron* (2), *Polygonion avicularis* (2) *Arction* (1), and *Dauco-Melilotion* (1). The following new syntaxa were distinguished: *Conyo-Cynodonetum dactylonii* (FELFÖLDY 1942) ELIÁŠ 1978, *Sambucetum ebuli* FELFÖLDY 1942 typicum ELIÁŠ 1978 and *brometosum inermis* ELIÁŠ 1978, community with *Chenopodium ficifolium*, *Plantaginio-Lolietum perennis* BEGER 1930 variant with *Hordeum murinum* and *Atriplicetum tataricae* UBRIZSY 1949 facies with *Artemisia annua*.

Linčianska II, bl. S-5, 917 00 Trnava, Československo.


V Československu je len málo mestských sídel, ktorých ruderálna vegetácia bola predmetom fytocenologického štúdia. Publikované boli výsledky dlhodobého výskumu ruderálnych spoločenstiev mesta Malacky (KRIPPELOVÁ 1972) a stručný prehľad spoločenstiev mesta Brna (GRÜLL 1971). Výsledky krátkodobého fytocenologického výskumu ruderálnych spoločenstiev v meste Sušice, v západných Čechách, publikoval PYŠEK (1972). Ten istý autor intenzívne sleduje ruderálnu vegetáciu mesta Plzne (PYŠEK 1974). ELIÁŠ (1974) pri štúdiu synantropných spoločenstiev komplexu 36 obcí v Hornom Požitaví sledoval aj ruderálnu vegetáciu mesta Zlaté Moravce. HILBERT (1971) sa zameral na osídlovanie mestských smetísk vegetáciou v intraviláne mesta Banská Štiavnica. Konečne HEJNÝ (1971) publikoval veľmi cenný metodologický príspevok k výskumu synantropnej kveteny a vegetácie veľkomesta (na príklade Prahy).

Vegetáciu mesta Trnavy sleduje autor od roku 1972. V predchádzajúcej práci (ELIÁŠ 1977b) uviedol výsledky štúdia piatich jarných efemérnych ruderálnych spoločenstiev. V predkladanej práci analyzuje ďalších 12 syntaxónov, ktoré sa vyskytujú na území mesta.

Mesto Trnava leží v Podunajskej nížine (juhozápadné Slovensko), v severnom výbežku Podunajskej roviny medzi sprašovými pahorkatinami Trnavskou a Nitrianskou, vo vzdialnosti asi 50 km severovýchodne od hlavného mesta SSR, Bratislavu. Priemerná nadmorská výška územia je 146 m. Mesto leží na pliocénnych panvových uloženinách (štŕky, piesky a ľily), ktoré sú prekryté štvrtohornými riečnymi usadeninami a sprašou. Pôvodným pôdnym typom sú čierne zeme na spraši (LUKNIŠ 1972).

Trnava leží v teplej klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota vzduchu je $9,6^{\circ}\text{C}$ a ročná suma zrážok 560 mm (obr. 1). Vegetačné obdobie je dlhé 184 dní (PETROVIČ 1968). Klimatické podmienky sú vhodné na pestovanie technických a špeciálnych plodín. Je to najprodukívnejšia polnohospodárska oblasť na Slovensku, západoslovenská repársko-obilnárska výrobná oblasť s významným pestovaním kukurice a s intenzívnym chovom ošípaných (POVINCOVÁ 1974).

Trnava patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Dôležitá geografická poloha (križovatka dvoch významných starých obchodných ciest) zohrala dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji mesta



Obr. 1. — Klimatický diagram meteorologickej stanice v Trnave. — Fig. 1 — Climatic diagram of the meteorological station in Trnava.

(VAREŠÍK 1975) ako aj pri formovaní dnešného druhotného zloženia ruderálnej flóry mesta. Dnešná Trnava je mesto s uzavoreným vretenovitým historickým jadrom. V štruktúre mesta sú zreteľne odlišené štvrti vnútorného starého mesta obohnaného hradbami a obvodové štvrti (VEREŠÍK 1974). Na vnútorné mesto navádzajú obvodové štvrtle nízkych rodinných domkov so záhradkami (napr. štvrtle Tulipán, Hurbanov, časť Kopánky atď.) a štvrtle starších vyšších obytných blokov (napr. sídlisko L. Podjavorinskej, SNP). Po celom obvode mesta dnes prebieha intenzívna výšková bytová výstavba. Vyrastajú nové sídliská ako Prednádražie I. a II., Linčianska II a Hlboká.

Trnava je mnohofunkčné mesto s výraznou priemyselnou funkciami. Počtom obyvateľov (38 840 v r. 1970) je na siedmnom mieste na Slovensku (VEREŠÍK 1. c.).

Z fytogeografického hľadiska patrí Trnava do okresu Podunajská nížina v podoblasti vlastnej panónskej flóry (Eupannonicum). Podľa vegetačných stupňov patrí do územia s rastlinstvom riečnych nív a teplomilných dubín (LUKNIŠ 1972). Synantropnú flóru okolia mesta Trnavy naposledy súborne spracovala FRANTOVÁ (1947).

METODIKA

Pri analýze porastov a syntéze fytocenologického materiálu sa postupovalo podľa zásad zúrišsko-montpellierierskej školy (BRAUN-BLANQUET 1951). Na ohodnotenie abundancie a dominancie sa použila 7-členná Braunova-Blanquetova stupnica. Názvy vyšších rastlín v tabuľkách i v texte práce sú používané podľa práce EHRENDORFERA (1973).

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SPOLOČENSTIEV

1. *Sambucetum ebuli* FELFÖLDY 1942

Spoločenstvo opísal FELFÖLDY (1942) z Maďarska. Z územia Československa neboli doposiaľ publikované žiadny fytocenologický materiál. ELLÁŠ (1974) stručne charakterizuje toto spoločenstvo v Hornom Požitaví, kde sa vyskytuje roztrúsene najmä na železničných svahoch. Na južnom Slovensku je spoločenstvo rozšírené na svahoch železničných tratí (tu lokálne aj hojne), ciest a prevýšených medzí, zriedkavejšie na ruderálnych stanovištiach v intravilánoch obcí. Na sever sme ho naznamenali pri Novom Meste nad Váhom, ale iste rastie i severnejšie.

V Trnave sa spoločenstvo vyskytuje na svahoch železničnej trate, ktorá prechádza mestom a na jeho západnom okraji. Mimo svahov sa vyskytuje

Tab. 1. — *Sambucetum ebuli* FELFÖLDY 1942


Číslo zápisu — Relevé No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Const.
Dátum — Date	21/9	21/9	21/9	21/9	19/8	3/9	21/9	21/9	21/9	21/9	21/9	27/9		
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	1972	1972	1972	1974	1975	1975	1972	1972	1975	1972	1975			
Pokryvnosť (%) — Cover (%)	12	20	25	20	32	12	24	24	20	15	24	40	10	
Počet druhov — No. of species	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	
	7	9	9	10	12	13	12	11	15	16	17	10	13	Stálosť
<i>Sambucetum ebuli</i>														V
<i>Sambucus ebulus</i>	4.5	5.5	4.5	4.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.4	
<i>Arction, Artemisietae</i>														
<i>Artemisia vulgaris</i>	.	r	1.1	+	1.1	+	.	r	r	r	+	r	1.1	V
<i>Carduus acanthoides</i>	.	.	r	.	r	(+)	.	.	r	r	.	.	1.1	III
<i>Urtica dioica</i>	+	+	1.2	1.2	.	1.2	II
<i>Ballota nigra</i>	r	.	.	r	.	.	.	r	r	.	.	.	+.2	II
<i>Conium maculatum</i>	r	r	I
<i>Tanacetum vulgare</i>	.	.	.	+	I
<i>Daucus carota</i>	+	I
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	+.2	.	.	.	I
Sprievodné — Companions														
<i>Convolvulus arvensis</i>	+	+	+	+	+	1.1	1.1	+	+	+	+	+	.	V
<i>Rubus caesius</i>	+	+	2.3	1.1	2.1	+	.	.	+	.	+	+	.	IV
<i>Galium aparine</i>	.	.	+	1.1	1.1	.	1.1	.	+	+	2.1	.	+	III
<i>Agropyron repens</i>	.	.	2.1	(1.1)	1.1	+	+	.	+	+	1.1	.	2.1	III
<i>Lepidium draba</i>	+	r	.	+	+	.	r	.	r	r	.	.	.	III
<i>Atriplex patula</i>	.	.	+	r	+	r	.	r	.	II
<i>Lactuca serriola</i>	.	r	.	.	.	r	.	.	r	.	r	1.1	.	II
<i>Pastinaca sativa</i>	.	r	1.2	.	+	r	r ^o	.	.	II
<i>Lathyrus tuberosus</i>	.	r	.	.	+	.	+	+	II
<i>Cirsium arvense</i>	+	r	.	.	.	r	r	.	.	II
<i>Bromus sterilis</i>	.	.	.	2.1	.	.	2.1	.	r	I
<i>Arrhenatherum elatius</i>	r	.	.	+	.2	.	.	.	+	I
<i>Calystegia sepium</i>	+	+	+	+	.	.	I
<i>Atriplex acuminata</i>	2.1	+	r	.	.	.	I
<i>Stellaria media</i>	+	.	+	I
<i>Atriplex tatarica</i>	.	.	.	r	.	.	.	+	I
<i>Hordeum murinum</i>	+	.	r	I
<i>Coronilla varia</i>	+	+	.	I
<i>Euphorbia esula</i>	r	+	.	.	.	I
<i>Bromus inermis</i>	.	r	r	.	.	.	I
<i>Aristolochia clematitis</i>	1.1	.	I
<i>Medicago sativa</i>	+	I
<i>Chelidonium majus</i>	+	I
<i>Humulus lupulus</i>	+	.	.	.	I
<i>Rosa canina</i>	+	I
<i>Clematis vitalba</i>	+	I
<i>Sambucus nigra</i>	+.2	I
<i>Setaria verticillata</i>	+	I
<i>Taraxacum officinale</i>	r	r	.	I
<i>Poa compressa</i>	1.2	I
<i>Triticum aestivum</i>	r	r	I
<i>Cuscuta</i> sp.	+	I
<i>Cichorium intybus</i>	r	I
<i>Acer platanoides</i> juv.	r	I
<i>Equisetum arvense</i>	r	I
<i>Galium verum</i>	(r)	.	.	I
<i>Echinochloa crus-galli</i>	r	I
<i>Juglans regia</i> juv.	r	.	.	I

Tab. 2. — *Sambucetum ebuli brometosum inermis* ELIÁŠ, subass. nova hoc loco

Číslo zápisu — Relevé No.	1 29/8 1972	2 12/9 1972	3 12/9 1972	4 12/9 1972	5 27/9 1975	Stálosť — Constancy
Dátum — Date						
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	32	8	20	32	18	
Pokryvnosť (%) — Cover (%)	100	100	100	100	100	
Počet druhov — No. of species	11	13	14	15	18	
<i>Sambucetum ebuli</i>						
<i>Sambucus ebulus</i>	4.4	4.4	4.4	3.4	3.4	V
<i>S. e. brometosum inermis</i>						
<i>Arrhenatherum elatius</i>	2.2	2.2	1.1	2.3	3.3	V
<i>Bromus inermis</i>	2.2	.	3.3	.	2.2	III
<i>Pimpinella saxifraga</i>	r	r	r	.	.	III
<i>Achillea millefolium</i>	.	.	.	+.2	r	II
<i>Falcaria vulgaris</i>	.	.	r	.	+.2	II
<i>Centaurea scabiosa</i>	+	I
<i>Galium verum</i>	.	+	.	.	.	I
<i>Poa pratensis</i>	.	.	+.2	.	.	I
<i>Dactylis glomerata</i>	.	.	.	+.2	.	I
<i>Silene inflata</i>	.	+	.	.	.	I
<i>Arction, Artemisietae</i>						
<i>Artemisia vulgaris</i>	+	+	r	+	+	V
<i>Melandrium album</i>	.	.	r	.	+	II
<i>Carduus acanthoides</i>	.	.	.	r	r°	II
<i>Arctium minus</i>	.	.	.	1.1	.	I
<i>Ballota nigra</i>	.	.	.	(3.3)	.	I
<i>Saponaria officinalis</i>	.	+	.	.	.	I
<i>Oenothera biennis</i> s. s.	.	r	.	.	.	I
Sprievodné — Companions						
<i>Agropyron repens</i>	+	.	1.2	2.2	+	IV
<i>Convolvulus arvensis</i>	+	+	.	+	+	IV
<i>Rubus caesius</i>	+	.	+	1.3	+	IV
<i>Lactuca serriola</i>	.	+	r	.	+	III
<i>Atriplex patula</i>	.	.	+	+	r	III
<i>Fallopia convolvulus</i>	.	.	.	+	r	II
<i>Phragmites communis</i>	.	.	.	1.2	.	I
<i>Galium aparine</i>	.	.	+	.	.	I
<i>Coronilla varia</i>	+	I
<i>Lathyrus tuberosus</i>	+	I
<i>Equisetum arvense</i>	.	+	.	.	.	I
<i>Pastinaca sativa</i>	+.2	I
<i>Equisetum ramosissimum</i>	.	.	+	.	.	I
<i>Euphorbia esula</i>	+	I
<i>Daucus carota</i>	+.2	I
<i>Eryngium campestre</i>	r	I
<i>Chenopodium album</i>	.	r	.	.	.	I
<i>Atriplex acuminata</i>	.	.	.	r	.	I
<i>Sonchus arvensis</i>	.	r	.	.	.	I

veľmi zriedkavo na ruderálnych stanovištiach blízko cest a plotov. Rastie na hlbších hlinitých alebo šlovitých pôdach bez skeletu. Stanovišta sú to všetko teplé a výslnné, ale pôdy pritom zásluhou zomknutého porastu príliš nevysychajú.

Fyziognómiu a štruktúru porastov jednoznačne určuje edifikátor spoločenstva — *Sambucus ebulus*. Tento v porastoch typickej subasociácie vytvára až 2 m vysoké, husto zomknuté jedince. Preto sa v typických porastoch ostatné druhy uplatňujú len málo. Floristické zloženie typickej subasociácie je zrejmé z Tab. 1. Vysokú stálosť majú druhy *Sambucus ebulus*, *Artemisia*



Obr. 2. — Diagramy počtu druhov v jednotlivých triedach stálosti pre analyzované ruderálne spoločenstvá. — Fig. 2 — Diagrams of the species numbers in the constancy classes for the analyzed ruderal plant communities: *Erigeron-Lactucetum* (E-L), *Atriplicetum nitentis* (An), *Echio-Melilotetum* (E-M), *Conyzo-Cynodonetum* (C-C), *Sambucetum ebuli typicum* (Se_t), *Convolvulo-Agropyretum* (C-A), *Eragrostio-Polygonetum* (E-P), *Ivaetum xanthiiifoliae* (Ix), *Sambucetum ebuli brometosum* (Se_b), *Chenopodieturn stricti* (Chs), *Lolio-Plantaginetum* (L-P), *Atriplicetum tataricae* (At).

vulgaris, *Convolvulus arvensis*, *Rubus caesius*, *Carduus acanthoides*, *Galium aparine*, *Agropyron repens* a *Lepidium draba*. Z prítomných druhov viaceré prerastajú okolo 2 m vysoké porasty, aby mohli existovať (*Artemisia*, *Lactuca*, *Atriplex*). Niekoľko druhov má odlišnú fenológiu ako *Sambucus ebulus* a rýchlejší vývin. Do generatívnej fázy sa dostávajú skôr a v období optima dominanty sú už plodné alebo odumreté (*Galium aparine*, *Bromus sterilis*, *Agropyron repens* a.). Málo druhov živorí v prízemnej vrstve a iné sa udržujú na okrají porastov. Druhove nie je spoločenstvo príliš bohaté. Počet druhov v zápisе sa pohyboval od 7 do 17 (priemer 11,8).

Fyziognomicky, floristicky a ekologicky odlišné sú porasty subasociácie *Sambucetum ebuli brometosum inermis* ELIÁŠ (Tab. 2). Sú to nižšie svahové porasty (výška okolo 1 m, maximálne do 1,5 m) na suchých, vysýchavých, menej výživných a niekedy aj skeletnatých pôdach, kde je *Sambucus ebulus* konkurenčne oslabený. Pri menšej pokryvnosti charakteristického druhu asociácie sa tu významne uplatňujú trávy *Bromus inermis* a *Arrhenatherum elatius* spolu s ďalšími druhami z triedy *Molinio-Arrhenatheretea* a *Festuco-Brometea*, často i *Agropyretea intermedii-repentis*. Priestor medzi oddialenými

jedincami *Sambucus ebulus* je silne zatrávnený diferenciálnymi druhmi subasociácie. Priemerný počet druhov v zápise je väčší ako v typickej subasociácii (14,2) a podiel hemikryptofytov dosahuje až 60 % oproti 43 % v typickej subasociácii (obr. 3). Pretože sa porasty tejto subasociácie v Trnave vyskytujú zriedkavo, zahrnuli sme do tab. 2 aj zápis z iných lokalít na západnom Slovensku.

Lokality zápisov k tab. 2

1. Trnava, západný svah násypu železničnej trate do Smolenie.
2. Rišňovce-Klačany, vrchol východného svahu železničnej trate.
3. Klačany, vrchol svahu nad železničnou traťou asi 150 m od železničnej stanice.
4. Leopoldov, opustená plocha pri železničnej stanici (čiastočne narušený porast).
5. Trnava, západný svah trate do Smolenie nedaleko železničného prechodu.

Sambucetum ebuli je spoločenstvo panónského až submediteránneho charakteru. Okrem Československa a Maďarska je uvádzané napr. z Rumunska (MORARIU 1943). GUTTE (1972) uvádzia jeden zápis zo Saska (južná časť NDR), kde sa vyskytuje veľmi vzáenne.

2. *Echio-Melilotetum albi* R. TÜXEN 1942

Echio-Melilotetum je v Československu dosť rozšíreným spoločenstvom. Na Morave ho zaznamenal GRÜLL (1971) v meste Brne. V Čechách ho sledoval PYŠEK (1972, 1973a, 1974) v meste Sušice, v obci Vroutek a v meste Plzeň (západné a severné Čechy), HEJNÝ (1974) v južných Čechách a ŠANDOVÁ (1976) v obci Holoubkov (západné Čechy). Zo Slovenska publikoval fytocenologický materiál doposiaľ len ELLAŠ (1978) z mesta Bratislava. Zaznamenal ho však na vhodných stanovištiach po celom juhozápadnom Slovensku. Na Morave a Slovensku sa vyskytujú druhy bohatšie porasty tejto asociácie.

V Trnave sa spoločenstvo vyskytuje v priestoroch železničnej stanice, kde porastá voľné plochy medzi kolajami nákladného nádražia. Rastie aj na starých skládkach riečnych štrkov a pieskov v priestore železničnej stanice a na obnažených skeletnatých pôdach na staveniskách. Na takýchto stanovištiach sme zaznamenali porasty v areáli Pedagogickej fakulty UK a v Hluboček, kde sa vyvinuli rozsiahlejšie porasty v priestore starej tehelne, na obnaženej pôde v areáli budúceho sídliska. Všetky spomínané stanovišťa sú extrémne suché, veľmi teplé a výslnné, s menším obsahom nitrátov v pôde.

Typickú fyzionómiu tomuto viacerstvovému a farebne najpestrejšiemu ruderálnemu spoločenstvu udávajú charakteristické druhy asociácie: *Echium vulgare*, *Melilotus officinalis* a *M. alba*. *Oenothera biennis* s. s. sa v Trnave vyskytuje len na železničných stanovištiach. Spoločenstvo je neobyčajne druhy bohaté. Počet druhov v zápise sa pohybuje od 25 do 42 (priemer 33,8). Rovnako aj počet druhov v najvyšších triedach stálosti je vysoký (obr. 2) a svedčí o veľkej homogénnosti porastov. Sú to druhy zväzu *Dauco-Melilotion*, radu *Onopordetalia*, triedy *Artemisietae*, ale i ďalšie teplomilné druhy tried *Festuco-Brometea* a *Molinio-Arrhenatheretea* (tab. 3). Pokryvnosť spoločenstva v typických porastoch len málokedy dosiahne 100 %. V spoločenstve je takmer 70 % viacročných druhov, z toho až 57 % hemikryptofytov (obr. 3).

Echio-Melilotetum je európske spoločenstvo. Bolo zaznamenané v rade európskych štátov: od Holandska (SISSINGH 1950) a Belgicka (LEBRUN et al.

Tab. 3. — *Echio-Melilotetum albi* R. TÜXEN 1942

Číslo zápisu — Relevé No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Stalost — Constancy
Dátum — Date	17/6	10/6	1/7	23/8	10/6	10/6	20/6	10/6	20/6	20/6	
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	1975	1972	1972	1976	1972	1972	1976	1972	1976	1976	
Pokryvnosť (%) — Cover (%)	12	20	50	12	30	50	30	36	36	24	
Počet druhov — No. of species	60	85	80	95	90	80	50	70	70	70	
<i>Echio-Melilotetum</i>											
<i>Melilotus officinalis</i>	3.3	+.2	2.2	2.2	3.2	3.4	2.2	1.2	2.2	+	V
<i>Echium vulgare</i>	1.2	2.2	3.2	4.2	3.2	+.2	1.2	3.2	2.2	2.2	V
<i>Melilotus alba</i>	.	.	+	.	.	.	1.2	.	.	1.2	II
<i>Oenothera biennis</i> s. s.	.	.	.	2.1	.	1.1	I
<i>Dauco-Melilotion, Artemisietae</i>											
<i>Daucus carota</i>	+	1.2	+.2	2.2	1.2	+	1.2	+	1.2	2.2	V
<i>Artemisia vulgaris</i>	r	1.1	1.1	+	1.1	1.1	+	1.1	+	1.1	V
<i>Medicago lupulina</i>	1.1	.	+	1.1	r	1.2	+	1.2	+	+	V
<i>Carduus acanthoides</i>	r	.	1.1	r	+	+	+	r	+	+	V
<i>Reseda lutea</i>	+	+	1.2	.	+	.	+	+	+	+	IV
<i>Linaria vulgaris</i>	.	+	.	+	+	1.1	+	+	.	r	IV
<i>Picris hieracioides</i>	.	+	.	+	+	+	+	r	+	+	IV
<i>Coronilla varia</i>	+	.	+.2	+	.	+	1.2	.	1.2	+	IV
<i>Berteroa incana</i>	+	+	.	+	.	.	.	+	r	+	III
<i>Cichorium intybus</i>	.	.	.	+	.	.	+	r	+	+	III
<i>Onopordon acanthium</i>	.	+.2	.	+	.	.	r	.	.	.	II
<i>Melandrium album</i>	.	.	1.1	.	r	r	II
<i>Tragopogon dubius</i>	.	.	r	.	.	.	+	.	.	+	II
<i>Crepis foetida</i>	r	r	.	.	II
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	+	1.2	I
<i>Anchusa officinalis</i>	.	+	I
<i>Tanacetum vulgare</i>	+	+.2	I
<i>Salvia nemorosa</i>	+	I
<i>Cirsium vulgare</i>	r	I
Sprievodné — Companions											
<i>Plantago lanceolata</i>	1.2	1.2	+	r	+	+	+	2.2	+	+	V
<i>Convolvulus arvensis</i>	r	1.1	1.1	1.2	+	+	+	1.2	+	+	V
<i>Lolium perenne</i>	1.2	.	+	+.2	1.2	r	+	2.2	1.2	+	V
<i>Bromus tectorum</i>	1.1	1.2	+	.	+	r	+	1.2	+	+	V
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	+	+	1.2	r	.	r	+	r	+	r	V
<i>Achillea millefolium</i>	.	1.1	.	1.2	+	+	1.2	+	+	+.2	IV
<i>Poa pratensis</i> et <i>angustifolia</i>	+	1.2	.	+	1.2	2.2	+	.	+	+	IV
<i>Centaura stoebe</i>	.	+	.	1.2	+	+	.	+	r	+	IV
<i>Lepidium draba</i>	r	+	.	+	1.1	+	.	.	+	+	IV
<i>Calamagrostis epigeios</i>	.	.	.	1.2	.	+.3	1.2	.	+	1.2	III
<i>Lathyrus tuberosus</i>	+	.	1.2	.	r	.	+	.	1.2	+	III
<i>Agropyron repens</i>	+	.	1.3	.	2.2	+	.	.	2.1	1.2	III
<i>Lactuca serriola</i>	.	+	r	.	r	.	+	+	+	+	III
<i>Hordeum murinum</i>	r	+	+	.	r	+	.	+	.	.	III
<i>Bromus sterilis</i>	r	+	+	.	1.1	.	.	r	.	.	III
<i>Papaver rhoeas</i>	r	.	r	.	r	.	.	+	+	+	III
<i>Conyza canadensis</i>	.	.	.	+	.	+	.	r	+	r	III
<i>Trifolium repens</i>	+	+	.	+	+	+	III
<i>Taraxacum officinale</i>	.	.	.	r	r	.	r	+	+	.	III
<i>Lepidium ruderale</i>	.	.	+	.	.	.	+	+	r	.	II
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	.	.	r	.	.	.	+	r	+	+	II
<i>Eryngium campestre</i>	.	.	.	+.2	.	+	r	.	.	r	II
<i>Dactylis glomerata</i>	.	+.2	.	.	+.2	+	.	+.2	.	.	II

Tab. 3 — pokračovanie

Číslo zápisu — Relevé No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dátum — Date	17/6	10/6	1/7	23/8	10/6	10/6	20/6	10/6	20/6	20/6	Stálosť — Constancy
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	12	20	50	12	30	50	30	36	36	24	
Pokryvnosť (%) — Cover (%)	60	85	80	95	90	80	50	70	70	70	
Počet druhov — No. of species	25	29	31	32	33	35	37	42	42	42	

*Arrhenatherum elatius**Rubus fruticosus**Plantago major**Poa compressa**Tussilago farfara**Falcaria vulgaris**Bromus inermis**Sisymbrium orientale**Descurainia sophia**Brachypodium pinnatum**Chenopodium album**Festuca rubra**Stachys annua**Consolida segetum**Rumex crispus*

Sprievodné druhy vyskytujúce sa len raz — Companion species occurring only once:

1: *Lepidium campestre* +, *Medicago falcata* 1.2, *Trifolium dubium* +.2; 2: *Agrostis vulgaris* +.2, *Arenaria serpyllifolia* +; 3: *Sonchus arvensis* +; 4: *Vicia sepium* r; 5: *Lotus corniculatus* +, *Populus nigra* r; 6: *Chondrilla juncea* +, *Robinia pseudo-acacia* r, *Silene inflata* +; 7: *Bromus mollis* +, *Fallopia convolvulus* +, *Mercurialis annua* r, *Setaria viridis* +, *Sinapis arvensis* r, *Xanthium strumarium* +; 8: *Poa annua* +, *Ranunculus repens* +, *Sympyrum officinale* +; 9: *Pastinaca sativa* r, *Silene dichotoma* +.2; 10: *Astragalus glycyphyllos* +, *Cerinthe minor* r, *Euphorbia esula* 1.l.

1949) až po Juhosláviu (MARKOVIĆ-GOSPODARIĆ 1965) a Rumunsko (COSTE 1975). Sissinghom navrhované rozdelenie asociácie sa doteraz neukázalo ako potrebné.


3. *Erigeron-Lactucetum serriolae* LOHMEYER 1950 apud OBERDORFER 1957

Toto spoločenstvo v Československu doposiaľ je uvádzané len z Brna (GRÜLL 1971), z mesta Sušice (PYŠEK 1972), z Plzne (PYŠEK 1974) a z Piešťan (MUCINA 1976). Na západnom Slovensku sa spoločenstvo vyskytuje často na opustených plochách v okolí stavenísk, kde bola odhrnutá alebo nahrnutá pôda, na nezatrávnených čerstvých svahoch ciest (napr. pozdĺž autostrády), ale i na úhorech, v opustených pridomových záhradách a viniciach. Na týchto plochách tvorí prvé osídlovacie fázy a ustupuje v sukcesnom sledu trvalejším spoločenstvám. Zaznamenali sme ho napr. v Komárne, Zlatých Moravciach, Nitre, v okolí Bratislavы a inde.

V Trnave sa spoločenstvo vyskytuje takmer výlučne v obvodových štvrtiach, kde prebieha intenzívna výstavba. Vyskytuje sa často až hojne na opustených plochách v okolí stavenísk (napr. na sídliskách Prednádražie II, Linčianska II), v opustených záhradách pri asanovaných domoch (v okolí závodu TAZ), na navážkach v iných častiach mesta. Všetko sú to čerstvé,

neuľahnuté, navozené alebo obnažené pôdy, obyčajne chudobné na nitráty.

Typickú fyzioognómiu spoločenstva určujú *Lactuca serriola* a *Conyza canadensis*. Častejšie dominuje prvý druh, ktorý vytvára na hlbších pôdach súvislé a nezriedka rozsiahle vysoké porasty (niekedy až 2 m). Výška porastov však značne kolíše. V druhove bohatšom spoločenstve (priemerný počet druhov



Obr. 3. — Spektrá životných foriem 12 spoločenstiev ruderálnej vegetácie Trnavy. — Fig. 3 — Life-form spectra of 12 syntaxa of the ruderal vegetation of Trnava: *Chenopodiectum stricti* (Chs), *Eragrostio-Polygonetum* (E-P), *Atriplicetum tataricae* (At), *Ivactum xanthiifoliae* (Ix), *Erigero-Lactucetum* (E-L), *Atriplicetum nitentis* (An), *Plantagini-Lolietum* (P-L), *Convolvulo-Agropyretum* (C-A), *Conyzo-Cynodonetum* (C-C), *Echio-Melilotetum* (E-M), *Sambucetum ebuli brometosum* (Se_b), *Sambucetum ebuli typicum* (Se_t).

v zápisе je 24) prevažujú jednorocné druhy (57 %, obr. 3). Typická pre spoločenstvo je spoločná účasť segetálnych i ruderálnych druhov, zvlášť na úhoroch a v opustených záhradách. Vyskytujú sa i porasty, ktoré by mohli byť priradené k variantu s *Tripleurospermum inodorum*, ktorý uvádzá GRÜLL (1971) z Brna.

Erigero-Lactucetum patrí aj v Trnave medzi prvé spoločenstvá, ktoré osídľujú obnažené a navozené opustené pôdy. Na sídlisku Linčianska II napr. nastúpilo hned po porastoch, v ktorých dominoval *Papaver rhoeas*. V ďalšej sukcesii ustupuje na ruderálnych stanovištiach porastom asociácie *Tanacetum-Artemisiëtum* a na úhoroch skôr porastom *Calamagrostis epigeios* a *Agropyron*

Tab. 4. — *Erigeron-Lactucetum serriolae LOHMEYER 1950 apud OBERDORFER 1957*

Zápis číslo — Relevé No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Constantey
Dátum — Date	20/9 1972	24/9 1972	27/8 1975	19/6 1976	27/8 1975	20/9 1972	29/8 1974								
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	15	28	15	25	50	12	12	9	9	45	12	24	6	6	
Pokryvnost (%) — Cover (%)	100	100	80	100	100	80	80	100	90	95	100	80	60		
Počet druhov — No. of species	18	19	20	21	19	20	24	26	26	27	27	31	31	27	Stálosť — Constancy
<i>Erigeron-Lactucetum</i>															
<i>Lactuca serriola</i>	4.4	3.1	3.4	4.4	4.1	3.3	2.1	2.1	1.1	2.1	3.3	1.1	3.1	3.1	V
<i>Conyza canadensis</i>	1.1	+	3.1	2.1	+	2.1	2.1	2.1	4.4	4.1	1.1	3.3	+	.	V
<i>Crepis capillaris</i>	.	+	r	+	r	r	.	+	+	.	(1.2)	.	+	.	III
<i>Fallopia convolvulus</i>	+	+	.	+	r	+	.	r	.	II
<i>Sisymbrium, Sisymbrietea</i>															
<i>Bromus sterilis</i>	.	.	+	.	.	+	.	+	.	+	.	1.1	.	.	II
<i>Atriplex tatarica</i>	+	.	+	.	r	.	.	+	.	.	II
<i>Atriplex patula</i>	+	.	r	.	.	1.1	II
<i>Atriplex acuminata</i>	.	+	+	1.1	II
<i>Hordeum murinum</i>	.	.	+	.	.	+	.	.	.	+.2	.	2.1	.	.	I
<i>Bromus tectorum</i>	.	.	+	.	.	+	.	+	r	.	I
<i>Chenopodium strictum</i>	I
<i>Iva xanthiifolia</i>	r	I
<i>Bromus mollis</i>	r	.	.	I
<i>Chenopodietae</i>															
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	2.1	4.3	+	+	1.1	+	2.1	2.1	+	1.1	3.3	+	2.1	2.1	V
<i>Cirsium arvense</i>	+	+	.	+	+	+	2.1	1.1	1.1	.	r	+	r	.	V
<i>Chenopodium album</i>	1.1	+	2.1	2.1	.	.	+	1.1	+	.	+	+	+	+	IV
<i>Stellaria media</i>	4.4	2.2	2.2	4.4	5.5	3.3	.	.	2.2	.	3.4	2.2	.	.	IV
<i>Sonchus oleraceus</i>	.	+	+	+	.	r	+	.	.	+	II
<i>Mercurialis annua</i>	+	..	r	+	r	+	.	.	II
<i>Setaria glauca</i>	+	.	.	.	r	.	3.2	.	.	1.1	.	+	II
<i>Echinochloa crus-galli</i>	r	+	.	.	r	.	r	II
<i>Amaranthus retroflexus</i>	+	.	.	+	r	I
<i>Solanum nigrum</i>	r	r	I
<i>Galinsoga parviflora</i>	.	+	.	+	r	I
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	.	.	r	r	I
<i>Galium aparine</i>	+	r	.	I
<i>Setaria viridis</i>	+	I
<i>Euphorbia helioscopia</i>	+	.	.	.	I
<i>Erodium cicutarium</i>	+	.	.	.	I
Sprievodné — Companions															
<i>Artemisia vulgaris</i>	.	+	r	+	+	1.1	+	+	+	r	+	+	+	+	V
<i>Carduus acanthoides</i>	.	2.1	+	.	+	+	1.2	2.1	.	+	1.1	+	1.1	+	IV
<i>Convolvulus arvensis</i>	r	+	r	+	+	.	+	.	+	+	.	+	2.1	+	IV
<i>Taraxacum officinale</i>	r	+	.	r	+	+	r	+	+	+	+	+	+	r	IV
<i>Lolium perenne</i>	.	.	1.2	.	.	+.2	.	r	+.2	+	+.2	+	+.2	+	III
<i>Plantago major</i>	.	r	r	r	r	+	.	r	.	r	r	.	.	.	III
<i>Achillea millefolium</i>	.	.	+.2	.	r	+.2	r	r	.	+	+	III
<i>Agropyron repens</i>	.	.	+.2	+.2	.	.	.	r	+	+	.	r	.	+	III
<i>Picris hieracioides</i>	.	.	+	+	.	+	.	1.1	.	+	.	r	.	.	II
<i>Daucus carota</i>	+.2	.	.	.	+	.	+	.	+	+.2	+	.	.	+.2	II
<i>Polygonum aviculare</i>	.	.	.	+	.	..	r	+	.	r	.	.	r	+	II
<i>Reseda lutea</i>	+.2	.	r	+	.	+	+	+	+.2	II

Tab. 4. — pokračovanie

Zápis číslo — Relevé No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Constancy
Dátum — Date		20/9 1972		24/9 1972		27/8 1975		19/6 1976		27/8 1975		20/9 1972		29/8 1974	
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	15	28	15	25	50	12	12	9	9	45	12	24	6	6	
Pokryvnosť (%) — Cover (%)	100	100	80	100	100	80	80	100	90	95	100	80	60		
Počet druhov — No. of species	18	19	20	21	19	20	24	26	26	27	27	31	31	27	Stálosť —

Avena fatua
Raphanus
raphanistrum
Medicago lupulina
Tragopogon dubius
Lathyrus tuberosus
Papaver rhoeas
Salsola kali
Lepidium draba
Conium maculatum
Viola arvensis
Linaria vulgaris
Plantago lanceolata
Dactylis glomerata
Calamagrostis epigeios
Sinapis arvensis
Rumex crispus
Lepidium ruderale
Juglans regia juv.

+	+	2.1	1.1	.	.	.	II	
+	+	.	.	1.1	.	+	+	.	.	II	
.	+	.	.	r	.	r	r	.	+	II	
.	r	+	1.2	r	.	.	II	
.	r	+	.	.	+	.	r	.	r	.	II	
.	+	+	.	.	+	.	+	+	.	.	I	
+	2.1	r	I	
.	+	.	.	+	.	.	.	+	.	.	I	
.	r	.	.	+	.	+	.	(r)	.	I	
.	r	+	.	.	.	+	I	
.	+	+	.	.	+	.	+	+	.	.	I	
.	+	.	.	+	.	+	+	.	.	I	
.	+	.	.	+	.	+	+	.	.	I	
.	+	2.2	.	+	2.2	.	.	.	+	2.2	.	I
.	+	2.2	.	+	2.2	I
.	+	2.2	.	+	2.2	I
.	+	2.2	.	+	2.2	I
.	+	2.2	.	+	2.2	I
.	+	2.2	.	+	2.2	I
.	+	2.2	.	+	2.2	I

Sprievodné druhy vyskytujúce sa len raz — Companion species occurring only once::

4: *Arctium lappa* r; 5: *Carduus crispus* +, *Melilotus officinalis* r; 6: *Betula verrucosa* +, *Clematis vitalba* 1.1; 7: *Polygonum lapathifolium* +; 8: *Cichorium intybus* +; 9: *Diplotaxis tenuifolia* +, *Tanacetum vulgare* r, *Verbascum blattaria* r, *Iris* sp. +; 10: *Echium vulgare* r, *Euphorbia platyphyllus* +, *Hordeum distichon* +; 11: *Anagallis arvensis* r, *Medicago sativa* r, *Onopordum acanthium* +; 12: *Epilobium parvifolium* +; 13: *Apera spica-venti* +, *Ballota nigra* r, *Festuca pratensis* r, *Triticum aestivum* +.2; 14: *Cerinthe minor* +, *Misopates orontium* r, *Rubus caesius* r, *Sonchus arvensis* +.2.

repens. Na staveniskách sídlisk je však najčastejšie zničené pri úpravách terénu a jeho plochy sú osiate trávami.

Erigeron-Lactucetum je známe z juhozápadnej časti NSR (OBERDORFER 1957), z NDR (GUTTE 1972, GUTTE et HILBIG 1975), z Polska (FIJALKOWSKI 1967, ROSTAŃSKI et GUTTE 1971, ANIOL-KWIATKOWSKA 1974) a z niektorých ďalších krajín.

4. *Atriplicetum nitentis* KNAPP 1945

Doposiaľ máme malo údajov o tomto spoločenstve v Československu. GRÜLL (1971) ho uvádzá z navážok mesta Brna ako *Sisymbrio-Atriplicetum nitentis* (KNAPP 1945) OBERDORFER 1957. PYŠEK (1974) uvádza druhove chudobné porasty spoločenstva z územia mesta Plzne. Z územia Slovenska neboli doposiaľ publikovaný žiadny fytoценologický materiál, hoci sa spoločenstvo vyskytuje dosť hojne na čerstvých navážkach v mnohých mestách na západnom Slovensku.

Tab. 5. — *Atriplicetum nitentis* KNAPP 1945

Číslo zápisu — Relevé No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dátum — Date	17/6	16/9	13/6	27/9	19/9	19/9	28/6	21/9	20/9	27/9	
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	6	8	6	15	12	20	20	10	12	15	Stálost Constancy
Pokryvnost (%) — Cover (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Počet druhov — No. of species	10	12	15	14	17	17	23	26	12	18	
<i>Atriplicetum nitentis</i>											
<i>Atriplex acuminata</i>	4.5	4.5	3.4	5.5	5.5	5.5	4.5	4.5	5.5	5.5	V
<i>Sisymbriumion, Sisymbrietea</i>											
<i>Lactuca serriola</i>	+	+	+	r	r	+	.	r	+	r	V
<i>Atriplex tatarica</i>	1.1	+	2.3	1.1	+	1.1	1.1	.	.	.	IV
<i>Atriplex patula</i>	.	.	r	r	r	+	r	.	.	.	III
<i>Descurainia sophia</i>	+	+	+	.	.	+	r	.	.	.	III
<i>Bromus sterilis</i>	.	.	.	+	1.1	.	+	+	.	.	II
<i>Hordeum murinum</i>	.	.	.	+	+	.	r	.	.	+	II
<i>Asperugo procumbens</i>	+.3	r	+	.	.	II
<i>Iva xanthiifolia</i>	r	r	.	.	.	I
<i>Conyza canadensis</i>	.	r	r	I
<i>Bromus tectorum</i>	.	+	I
<i>Bromus mollis</i>	.	.	+	I
<i>Artemisia annua</i>	.	r	I
<i>Sisymbrium orientale</i>	r	I
<i>Chenopodietae</i>											
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	r	r	+	.	.	2.2	+	r	+	.	IV
<i>Chenopodium album</i>	.	.	.	r	1.1	+	1.1	r	+	1.1	IV
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	.	+	+	.	r	.	+	.	.	.	II
<i>Cirsium arvense</i>	.	r	.	.	+	.	.	1.1	r	.	II
<i>Lepidium draba</i>	.	.	+	r	.	.	.	r	.	.	II
<i>Amaranthus retroflexus</i>	.	.	.	+	r	r	.	.	.	+	II
<i>Stellaria media</i>	1.2	.	.	.	+	I
<i>Echinochloa crus-galli</i>	+	I
<i>Sonchus oleraceus</i>	r	.	I
<i>Thlaspi arvense</i>	r	I
Sprievodné — Companions											
<i>Artemisia vulgaris</i>	.	r	+	.	+	+	+	.	r	r	IV
<i>Carduus acanthoides</i>	r	+	r	r	+	r	III
<i>Agropyron repens</i>	+	.	1.1	.	.	+	+	.	.	+	III
<i>Ballota nigra</i>	r	.	.	+	+	r°	.	+	+	+	III
<i>Convolvulus arvensis</i>	.	.	.	+	+	+	.	+	+	r	III
<i>Polygonum aviculare</i>	.	.	r	.	.	+	.	.	.	r	II
<i>Conium maculatum</i>	.	.	.	r	r	.	r	.	.	.	II
<i>Galium aparine</i>	+	.	.	+	.	.	I
<i>Papaver rhoeas</i>	+	r	.	.	.	I
<i>Lolium perenne</i>	.	.	+	.	.	+	r	.	.	.	I
<i>Achillea millefolium</i>	.	r	.	.	.	r	I
<i>Lepidium ruderale</i>	+	.	.	+	I
<i>Rumex crispus</i>	r	.	r	.	.	.	I

Sprievodné druhy vyskytujúce sa len raz — Companion species occurring only once:

- 3: *Falcaria vulgaris* r, *Poa compressa* r; 4: *Bromus inermis* +, *Kochia scoparia* + .2, *Rubus caesius* +; 5: *Onopordon acanthium* +; 7: *Daucus carota* r, *Lapsana communis* +, *Melilotus officinalis* r, *Polygonum persicaria* +, *Triticum aestivum* r; 8: *Arrhenatherum elatius* +, *Dactylis glomerata* + .2, *Fallopia convolvulus* r, *Galium cruciata* +, *Galium mollugo* 1.2, *Geranium pratense* r, *Geum urbanum* r, *Glechoma hederacea* r, *Chaerophyllum aromaticum* r, *Leonurus cardiaca* r, *Sinapis arvensis* +, *Urtica dioica* + .2, *Viola riviniana* +; 9: *Reseda lutea* r, *Taraxacum officinale* +; 10: *Berteroa incana* r, *Arctium* sp. juv. +.

V Trnave sa spoločenstvo vyskytuje často na čerstvých navážkach zeminy (obyčajne kvalitnej pôdy) v obvodových štvrtiach mesta. Je to neskoro letné spoločenstvo jednoročných druhov (v spoločenstve je 57 % terofytov), ktoré skoro ustupuje trvalejším spoločenstvám. V analyzovaných porastoch sa počet druhov pohyboval od 10 do 26; niekedy však presahuje aj 30. Vo vysokých a hustých porastoch *Atriplex acuminata* sa ostatné jedno- i viacročné druhy uplatňujú len málo (tab. 5). Pre trnavské porasty je typická účasť teplomilného druhu *Atriplex tatarica*, podobne ako v Brne (GRÜLL 1971), a stojí tak blízko asociácií *Atriplicetum nitentis* SLAVNIĆ 1951. Ide zrejme o panónsku až submediteránnu rasu, ktorá by mohla byť hodnotená prípadne aj ako samostatná subasociácia.

Najviac údajov o *Atriplicetum nitentis* pochádza z NSR a NDR (TÜXEN 1950, OBERDORFER 1957, PASSARGE 1964, GUTTE et HILBIG 1975). Vyskytuje sa aj v Poľsku (ROSTAŃSKI et GUTTE 1971, ANIOŁ-KWIATKOWSKA 1974) a iste rastie i v ostatných európskych krajinách. V panónskej oblasti sa stretáva s porastami asociácie *Atriplicetum tataricae* UBRIZSY 1949. Tu môže vytvárať rôzne prechody, ktoré však nemusia mať syntaxonomickú hodnotu. V panónskej oblasti sa rozširuje len v posledných rokoch a preto je fažké stanoviť syntaxonomickú hodnotu týchto jednotiek.

5. *Atriplicetum tataricae* UBRIZSY 1949

Spoločenstvo je pravdepodobne hojné na celom južnom Slovensku a južnej Morave. KRIPEĽOVÁ (1969) uvádzá zápis z juhozápadného a východného Slovenska, v ktorých sa významne uplatňuje aj *Iva xanthiifolia*. GRÜLL (1971) provizórne ustanobil novú asociáciu *Sisymbrio-Atriplicetum tataricae* prov., ktorú však možno považovať za subasociáciu tohto spoločenstva.

V Trnave vytvára *Atriplex tatarica* súvislé porasty na čerstvých navážkach zeminy, na svahoch kalových polí v Trnave-Rybníku, ale i na obnažených pôdach blízko ciest a železničnej trate v obvodových štvrtiach mesta s priemyselnou výstavbou. Výslnné a teplé stanovišta sú pomerne suché.

Floristicky nie sú husté porasty *Atriplex tatarica* bohaté (tab. 6). Priemerný počet druhov v zápisе je 12,3. V spoločenstve prevládajú jednoročné druhy (64 % terofytov), ktoré majú tiež nízke hodnoty abundancie a dominacie.

Spoločenstvo je v posledných rokoch vytláčané veľmi agresívnym neofytom — *Iva xanthiifolia*, ktorý často faciálne prevládne. Takéto porasty bolo možné pozorovať hlavne v Trnave-Rybníku. V tejto časti mesta do porastov *Atriplex tatarica* vstupuje aj *Artemisia annua*. Podobné porasty popísal MORARIU (1943) ako spoločenstvo s *Artemisia annua* a neskôr FIJAŁKOWSKI (1967) ako samostatnú asociáciu *Artemisietum annuae*. Porasty, ktoré ilustruje nasledujúci zápis, považujeme za *Atriplicetum tataricae* facies s *Artemisia annua*.

Zápis č. 7 — Trnava-Rybník, rozsiahle rumovisko za športovým areálom, 100 m², 26 druhov, 21. 9. 1974 (ELIÁŠ et ZALIBEROVÁ).

Artemisia annua 3.3 *Atriplex tatarica* 2.2, *Tripleurospermum inodorum* 2.2, *Iva xanthiifolia* 1.1, *Chenopodium album* 1.1, *Ballota nigra* 1.1, *Atriplex patula* +, *Polygonum lapathifolium* +, *Solanum nigrum* +, *Fallopia convolvulus* +, *Lactuca serriola* +, *Echinocloa crus-galli* +, *Descurainia sophia* +, *Amaranthus retroflexus* r, *Atriplex acuminata* r, *Chenopodium polyspermum* r, *Sonchus oleraceus* r, *S. arvense* r, *Carduus acanthoides* r, *Rumex stenophyllus* r, *Urtica dioica* r, *Phragmites communis* r, *Rorippa silvestris* r, *Plantago major* r, *Melilotus officinalis* r, *Kickxia spuria* r.

Tab. 6. — *Atriplicetum tataricae* UBRIZSY 1949

Číslo zápisu — Relevé No.	1 16/8 1974	2 27/9 1975	3 24/9 1972	4 21/9 1972	5 24/9 1972	6 17/9 1975	Stalost — Constancy
Dátum — Date							
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	25	100	18	26	30	10	
Pokryvnosť (%) — Cover (%)	100	100	100	100	100	95	
Počet druhov — No. of species	13	9	9	12	15	16	
<i>Atriplicetum tataricae</i>							
<i>Atriplex tatarica</i>	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.5	V
<i>Sisymbriion, Sisymbrietea</i>							
<i>Atriplex acuminata</i>	r	.	r	r	.		III
<i>Atriplex patula</i>	.	r	+	r	.		III
<i>Amaranthus retroflexus</i>	1.1	.	.	r	r		III
<i>Descurainia sophia</i>	+	.	+	.	.		II
<i>Hordeum murinum</i>	+	+	.	.	.		II
<i>Bromus sterilis</i>	.	r	.	1.1	.		II
<i>Lactuca serriola</i>	.	r	.	.	r		II
<i>Iva xanthiifolia</i>	1.1	r	.	.	.		I
<i>Chenopodietae</i>							
<i>Chenopodium album</i>	+	1.1	1.1	.	.	+	III
<i>Echinochloa crus-galli</i>	r	.	r	.	.		II
<i>Solanum nigrum</i>	r	.	.	.	r		II
<i>Digitaria sanguinalis</i>	2.2	.	I
<i>Setaria glauca</i>	1.2	I
<i>Fallopia convolvulus</i>	r	I
<i>Setaria viridis</i>	.	.	r	.	.	.	I
Sprievodné — Companions							
<i>Artemisia vulgaris</i>	.	.	r	+	+	r	III
<i>Convolvulus arvensis</i>	.	.	1.1	+	+	.	III
<i>Cuscuta</i> sp.	.	.	.	1.1	+	+	III
<i>Agropyron repens</i>	.	.	r	+	.	+	III
<i>Carduus acanthoides</i>	r	.	.	r	r	.	III
<i>Conium maculatum</i>	+	r	II
<i>Polygonum aviculare</i>	+	r	II
<i>Triticum aestivum</i>	r	+	II
<i>Arctium lappa</i>	.	.	.	+	.	+	II
<i>Lepidium ruderale</i>	+	.	I
<i>Arctium minus</i>	+	I
<i>Rubus caesius</i>	.	.	+	.	.	.	I
<i>Phragmites communis</i>	+	.	I
<i>Polygonum lapathifolium</i>	+	I
<i>Sambucus ebulus</i>	+	.	I
<i>Polygonum persicaria</i>	+	.	I
<i>Medicago falcata</i>	.	r	I
<i>Lolium perenne</i>	r	I
<i>Onopordon acanthium</i>	r	.	I
<i>Taraxacum officinale</i>	r	.	I
<i>Rumex crispus</i>	r	.	I

Atriplicetum tataricae je panónske spoločenstvo. Okrem Maďarska (SÓÓ 1961) je známe aj z Rumunska (MORARIU 1943), kde do týchto porastov vstupuje aj *Cynodon dactylon*. ANIOŁ-KWIATKOWSKA (1974) uvádza z juhozápadného Polska spoločenstvo s *Atriplex tatarica*. V NDR sú porasty s *Atri-*

plex tatarica zaraďované do asociácie *Atriplici tataricae-Hordeetum murini* (FELF. 42) Tx. 50 (porovnaj napr. GUTTE 1972). Tam zrejme asociácia *Atriplicetum tataricae* doznieva a konkurečne slabšia *Atriplex tatarica* vytvára porasty s *Hordeum murinum*.

6. *Ivaetum xanthiifoliae* FIJAŁKOWSKI 1967

Iva xanthiifolia vstúpila do ruderálnych porastov spoločenstiev zväzu *Sisymbrium officinalis* v Československu pred r. 1948 (HEJNÝ 1958, KRIPPELOVÁ 1969). Vo viacerých asociáciách vytvára faciálne porasty (napr. v *Atriplicetum tataricae*, *Chenopodietum stricti*, *Atriplicetum nitentis*, *Lamio-Conietum*, *Arctio-Ballobetum* ap.). Mnohé z týchto porastov sa postupne natolko diferencovali, že dnes v mnohých prípadoch ľahko najst bližšie vzťahy k pôvodnému spoločenstvu. FIJAŁKOWSKI (1967) zaradil porasty s dominujúcim druhom *Iva xanthiifolia* do samostatnej asociácie. Takéto riešenie považujem aj pre územie Československa dnes za opodstatnené.

V Trnave sa *Iva xanthiifolia* s istotou vyskytovala v r. 1971. Presný dátum zavlečenia nie je známy. V prvých rokoch prenikala do porastov *Atriplicetum tataricae* (porovnaj napr. zápis č. 1 v tab. 6) a iných spoločenstiev zväzu *Sisymbrium*. V posledných dvoch rokoch sú veľmi hojné porasty s dominujúcou *Iva xanthiifolia* v Trnave-Rybníku, na sídlisku SNP a blízko železničnej stanice. Floristické zloženie týchto porastov je zrejmé z tab. 7. Popri druhoch zväzu *Sisymbrium* sú s vysokou stálosťou zastúpené aj druhy zväzu *Arction* a triedy *Artemisieta*. Počet druhov v zápise sa pohybuje od 11 do 17. Výrazne prevládajú jednoročné druhy (62 %).

7. *Chenopodietum stricti* OBERDORFER 1957

V Československu je toto spoločenstvo doposiaľ uvádzané len z územia Čiech a Moravy. GRÜLL et PRISZTER (1973) ho uvádzajú z Brna a PYŠEK (1972, 1974) z mesta Sušice a Plzne v západných Čechách. Z územia Slovenska neboli doposiaľ publikovaný žiadny fytoценologický materiál.

V Trnave sa spoločenstvo vyskytuje na čerstvých navázkach v blízkosti novostavieb, ale i na skládkach zeminy v rôznych častiach mesta. Veľmi rozsiahle porasty boli na opustenej ploche blízko kalových polí v Trnave-Rybníku (pri úpravách terénu boli však v r. 1975 zničené).

Floristické zloženie porastov je vidieť z tab. 8. V tomto pionierskom, krátkodobom spoločenstve silne prevládajú jednoročné druhy (až 83 %, obr. 3). Podľa prevládania druhov môžeme odlišiť tri varianty: s *Chenopodium album*, s *Amaranthus retroflexus* a s *Chenopodium ficifolium*. Podobné typy porastov uvádzajú aj GRÜLL (1971) z Brna a PYŠEK (1974) z Plzne.

Osobitnú pozornosť si zasluhujú porasty variantu s *Chenopodium ficifolium*. Grullove zápisy tohto variantu z územia mesta Brna, v ktorých výrazne dominuje *Chenopodium ficifolium*, publikoval AELLEN (1972). PYŠEK (1974) uvádzá, že typ s *Chenopodium ficifolium* sa vyskytuje na silne humóznych pôdach v príľahlých dedinách a okrajových častiach mesta Plzne. V Trnave na kalových poliach cukrovaru, na usadených saturačných kaloch bohatých na minerálne látky, kypričkach a neuľahnutých substrátoch na dnach nádrží, ale i na ich svahoch sa vytvárajú porasty s dominujúcim *Chenopodium ficifolium*. Tieto porasty sú bez charakteristických a diagnostických druhov asociácie *Chenopodietum stricti* a preto ich predbežne označujeme ako spoločenstvo s *Chenopodium ficifolium*. Ďalší snímkový materiál ukáže, či bude

Tab. 7. — *Ivaetum xanthifoliae* FIJALKOWSKI 1967

Číslo zápisu — Relevé No.	1	2	3	4	5	6	Stálosť — Constancy
Dátum — Date	27/9 1975	27/9 1975	27/9 1975	27/9 1975	21/9 1974	27/9 1975	
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	9	15	20	15	100	25	
Pokryvnosť (%) — Cover (%)	100	100	100	100	100	100	
Počet druhov — No. of species	11	12	12	14	15	17	
<i>Ivaetum xanthiifoliae</i>							
<i>Iva xanthiifolia</i>	4.5	4.5	5.5	4.4	4.5	4.5	V
<i>Sisymbrium, Sisymbrietea</i>							
<i>Atriplex tatarica</i>	.	.	+	+	2.1	2.1	III
<i>Atriplex acuminata</i>	.	.	+	1.3	r	r	III
<i>Lactuca serriola</i>	.	.	r	+	r	r	III
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	.	r	.	.	1.1	+	III
<i>Bromus sterilis</i>	.	.	.	1.1	.	.	I
<i>Chenopodium ficifolium</i>	.	.	.	+	.	.	I
<i>Sisymbrium officinale</i>	.	r	I
<i>Atriplex patula</i>	r	.	I
<i>Descurainia sophia</i>	r	.	I
<i>Artemisia annua</i>	+	.	I
<i>Datura stramonium</i>	r	I
<i>Chenopodietae</i>							
<i>Chenopodium album</i>	r	r	+	1.1	+	1.1	V
<i>Cirsium arvense</i>	.	.	+	+	.	.	II
<i>Stellaria media</i>	.	.	.	+	.	+	II
<i>Echinochloa crus-galli</i>	r	I
<i>Amaranthus chlorostachys</i>	+	I
<i>Solanum nigrum</i>	+	I
<i>Sonchus arvensis</i>	r	.	I
<i>Xanthium strumarium</i>	r	I
Sprievodné — Companions							
<i>Artemisia vulgaris</i>	.	1.1	+	+	1.1	+	IV
<i>Conium maculatum</i>	r	.	r	1.2	r	+	IV
<i>Arctium lappa</i>	r	.	.	r	+	+	III
<i>Ballota nigra</i>	+3	+	.	+	.	.	III
<i>Urtica dioica</i>	+	+	r	.	.	.	III
<i>Polygonum aviculare</i>	+	+	II
<i>Glechoma hederacea</i>	.	.	+3	.	.	+3	II
<i>Agropyron repens</i>	.	.	.	+	.	.	I
<i>Carduus acanthoides</i>	+	I
<i>Triticum aestivum</i>	I
<i>Lepidium ruderale</i>	.	+	I
<i>Medicago sativa</i>	+	I
<i>Trifolium repens</i>	.	.	+	.	.	.	I
<i>Polygonum lapathifolium</i>	r	.	I
<i>Taraxacum officinale</i>	.	r	.	.	r	.	I
<i>Rumex crispus</i>	r	.	I
<i>Achillea millefolium</i>	.	r	I
<i>Tanacetum vulgare</i>	.	r	I
<i>Mercurialis annua</i>	r	I

možné uvažovať o samostatnej asociácii. Ako príklad týchto porastov môžem uviesť nasledujúci zápis.

Tab. 8. — *Chenopodietum stricti* OBERDORFER 1957

Číslo zápisu — Relevé No.	1	2	3	4	5	6	Stálost — Constancy
Dátum — Date	1/10 1975	19/9 1972	21/9 1972	27/9 1972	19/9 1972	20/6 1976	
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	8	8	15	8	9	15	
Pokryvnosť (%) — Cover (%)	100	100	80	100	90	100	
Počet druhov — No. of species	13	11	14	14	17	14	
<i>Chenopodietum stricti</i> :							
<i>Chenopodium album</i>	3.3	4.5	1.1	3.4	+	1.1	V
<i>Chenopodium strictum</i>	+	1.1	3.3	+	1.1	.	IV
<i>Amaranthus retroflexus</i>	1.1	.	1.1	2.3	3.4	.	III
<i>Chenopodium ficifolium</i>	5.5	I
<i>Sisymbriion, Sisymbrietea</i> :							
<i>Atriplex tatarica</i>	.	+	.	+	+	+	III
<i>Atriplex acuminata</i>	.	+	.	.	r	+	III
<i>Lactuca serriola</i>	.	r	.	.	.	r	II
<i>Iva xanthiifolia</i>	.	+	.	.	.	+	II
<i>Descurainia sophia</i>	.	+	.	.	.	+	II
<i>Hordeum murinum</i>	.	+	.	+	.	.	II
<i>Malva neglecta</i>	.	.	.	+	.	.	I
<i>Bromus sterilis</i>	.	+	I
<i>Datura stramonium</i>	r	.	I
<i>Chenopodietae</i> :							
<i>Solanum nigrum</i>	1.1	.	+	r	.	.	III
<i>Mercurialis annua</i>	1.1	.	+	.	+	.	III
<i>Stellaria media</i>	2.2	.	+	+	.	.	III
<i>Setaria glauca</i>	.	.	+	+2	r	r	III
<i>Echinochloa crus-galli</i>	.	.	r	1.2	+	.	III
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	.	.	.	+	+	+	III
<i>Galinsoga parviflora</i>	+	.	+	.	.	.	II
<i>Polygonum persicaria</i>	+	+	II
<i>Chenopodium hybridum</i>	+	+	II
<i>Amaranthus chlorostachys</i>	+	.	I
<i>Lamium purpureum</i>	+	I
<i>Digitaria sanguinalis</i>	+	I
<i>Stachys annua</i>	+	I
<i>Fallopia convolvulus</i>	.	.	.	r	.	.	I
<i>Sonchus oleraceus</i>	r	.	I
<i>Cirsium arvense</i>	r	.	I
Sprievodné — Companions:							
<i>Lolium perenne</i>	+	.	.	.	r	.	II
<i>Polygonum aviculare</i>	.	.	.	+	.	+	II
<i>Agropyron repens</i>	.	.	r	.	+	.	II
<i>Artemisia vulgaris</i>	.	r	.	r	.	.	II
<i>Reseda lutea</i>	+	I
<i>Convolvulus arvensis</i>	.	+	I
<i>Avena fatua</i>	.	.	+	.	.	.	I
<i>Raphanus raphanistrum</i>	.	.	+	.	.	.	I
<i>Lycopersicum esculentum</i>	.	.	+	.	.	.	I
<i>Atriplex hortensis</i>	.	.	r	.	.	.	I
<i>Carduus acanthoides</i>	r	.	I
<i>Conium maculatum</i>	r	I
<i>Melilotus officinalis</i>	r	I

Zápis č. 7, Trnava-Rybník, dno kalového poľa za cukrovarom, 18 m², 100 %, 12 druhov, 20. 6. 1976.

Chenopodium ficifolium 5.5, *Polygonum persicaria* 2.1, *Atriplex acuminata* +, *Sonchus oleraceus* +, *Atriplex tatarica* +, *Tripleurospermum indorum* +, *Iva xanthiifolia* +, *Sinapis arvensis* +, *Cirsium arvense* +, *Raphanus raphanistrum* +, *Sonchus arvensis* r, *Plantago major* r.

Druhove bohatší porast sme naznamenali na svahu kalového poľa nitrianskeho cukrovaru za objektom ČSAD:

Zápis č. 8, Nitra, svah kalového poľa, 60 m², 100 %, 20 druhov, 16. 6. 1976.

Chenopodium ficifolium 5.5, *Vicia cracca* 1.3, *Cirsium arvense* +, *Atriplex acuminata* +, *Polygonum persicaria* +, *Stellaria media* +, *Tripleurospermum inodorum* +, *Lactuca serriola* +, *Rumex stenophyllus* +, *Atriplex tatarica* r, *Chenopodium hybridum* r, *Lepidium ruderale* r, *Plantago major* r, *Taraxacum officinale* r, *Potentilla supina* r, *Ranunculus sceleratus* r, *Medicago lupulina* r, *Artemisia vulgaris* r, *Urtica dioica* r, *Beta vulgaris* r.

8. *Agropyretum repentis* FELFÖLDY 1942

Toto poloruderálne spoločenstvo popísané Felföldym (FELFÖLDY 1942) z panónskej oblasti, sa vyskytuje dosť hojne na opustených antropogénnych a narušených prirodzených plochách v celej ČSSR. Doteraz bolo uvádzané z Brna (GRÜLL 1971), z mesta Plzne (PYŠEK 1974) a z južných Čiech (HEJNÝ 1974). Zo Slovenska nebol doposiaľ publikovaný žiadny fytocenologický materiál. Spoločenstvo je však na vhodných stanovištiach po celom západnom Slovensku.

V Trnave sa spoločenstvo vyskytuje dosť často na obnažených a opustených pôdach v okolí priemyslových podnikov, v priestore železničnej stanice, ale aj inde v obvodových štvrtiach mesta. Stanovištia sú teplé, výslné a suché.

Fytocenózy majú nejčastejšie charakter lemov v alebo pozdĺž plotov rôznych objektov, ale vyskytujú sa aj plošné porasty. Štruktúru spoločenstva určuje *Agropyron repens*, po ktorom sa popína *Convolvulus arvensis*. Ostatné druhy vyplňajú volný priestor v porastoch (tentot mohol vzniknúť aj ich narušením) alebo sú na ich okraji. Geofity určujú štruktúru i ekológiu spoločenstva. Popri hemikryptofytach (45 %) sa uplatňujú aj terofyty (32 %). V porastoch sa vyskytuje priemerne 13,3 druhov. Ich floristické zloženie dokumentuje tab. 9.

Spoločenstvo popísal FELFÖLDY (1942) z Maďarska. Vyskytuje sa však po celej strednej Európe: v NSR (GÖRS 1966), v NDR (GUTTE et HILBIG 1975), v Poľsku (ROSTAŃSKI et GUTTE 1971), Československu a zaiste i inde v teplejších oblastiach stredoeurópskych štátov.

9. *Conyzo-Cynodonetum dactyloni* (FELFÖLDY 1942) ELIÁŠ

Spoločenstvá s *Cynodon dactylon* v Československu boli doposiaľ študované len na Slovensku. KRIPEĽOVÁ (1972) zaradila porasty s dominanciou druhu *Cynodon dactylon* na zošľapovaných stanovištiach v Malackách do asociácie *Cynodono-Plantaginetum* GAMS 1927. ELIÁŠ (1974) sledoval podobné porasty na nezošľapovaných železničných stanovištiach v Hornom Požitaví a označil ich predbežne ako spoločenstvo s *Cynodon dactylon*. Po doplnení fytocenologického materiálu zo železničných stanovišť celého juhovýchodného Slovenska sa rozhodol pre hore uvedené riešenie.

Conyzo-Cynodonetum zahŕňa nešľapané porasty s dominujúcim druhom *Cynodon dactylon* na železničných stanovištiach a okrajoch cest v celej pa-

Tab. 9 — *Agropyretum repentis* FELFÖLDY 1942

Číslo zápisu — Relevé No. Dátum — Date Plocha (m ²) — Plot area (m ²) Pokryvnosť (%) — Cover (%) Počet druhov — No. of species	1 19/8 7 100 7	2 15/6 1972 100 11	3 20/8 1973 100 12	4 15/6 1973 95 15	5 15/6 1973 100 16	6 15/6 1973 95 16	7 17/5 1975 100 12	8 17/5 1975 95 17	Stalosť — Constancy
<i>Convolvulo-Agropyretum</i> , <i>Convolvulo-Agropygion</i> , <i>Agropyretea repentis</i>									
<i>Agropyron repens</i>	4.5	3.4	4.5	4.4	4.4	3.3	3.4	+	V
<i>Convolvulus arvensis</i>	2.1	3.1	2.1	2.2	2.1	3.3	1.1	3.3	V
<i>Lepidium draba</i>	r	+	.	+	+	1.1	2.1	3.4	V
<i>Falcaria vulgaris</i>	+ .2	.	.	.	I
Sprievodné — Companions									
<i>Ballota nigra</i>	r	2.1	r	.	+	+	.	1.2	IV
<i>Artemisia vulgaris</i>	.	+	.	+	+	1.1	.	r	III
<i>Hordeum murinum</i>	+	+	.	+	r	1.1	.	.	III
<i>Bromus sterilis</i>	+	.	r	.	+	.	1.1	1.1	III
<i>Achillea millefolium</i>	+	+	r	+	III
<i>Galium aparine</i>	.	.	+	.	.	+	+	1.1	III
<i>Rumex crispus</i>	+ .2	+ .2	r	II
<i>Cirsium arvense</i>	r	.	r	.	.	r	.	.	II
<i>Taraxacum officinale</i>	.	.	.	+	.	.	+	+	II
<i>Poa pratensis</i>	.	+	+	+	II
<i>Acer platanoides</i> juv.	.	.	r	.	+	.	+ .2	.	II
<i>Plantago lanceolata</i>	.	.	.	+	.	.	(r)	r	II
<i>Cardus acanthoides</i>	.	+	r	I
<i>Bromus tectorum</i>	.	.	.	+	.	r	.	.	I
<i>Chenopodium album</i>	.	.	r	.	.	r	.	.	I
<i>Lactuca serriola</i>	.	r	r	I
<i>Cichorium intybus</i>	.	.	.	+	r	.	.	.	I
<i>Plantago major</i>	.	.	.	r	I
<i>Polygonum aviculare</i>	1.2	.	.	I
<i>Lolium perenne</i>	.	.	.	1.2	I
<i>Atriplex tatarica</i>	1.2	.	.	I
<i>Trifolium repens</i>	.	.	.	+	I
<i>Euphorbia esula</i>	.	.	1.1	I
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	.	.	.	+	I
<i>Avena fatua</i>	+	.	.	.	I
<i>Melandrium album</i>	+	.	.	.	I
<i>Sambucus nigra</i> juv.	+ .2	.	I
<i>Linaria vulgaris</i>	+	I
<i>Medicago sativa</i>	+	.	.	I
<i>Festuca pratense</i>	+	.	.	I
<i>Reseda lutea</i>	.	.	.	r	I
<i>Diplotaxis muralis</i>	.	.	.	r	I
<i>Atriplex patula</i>	.	.	r	I
<i>Iva xanthiifolia</i>	.	r	I
<i>Pastinaca sativa</i>	r	.	.	.	I
<i>Medicago falcata</i>	.	r	I
<i>Ailanthus glandulosa</i> juv.	r	.	.	.	I
<i>Sambucus ebulus</i>	r	.	I
<i>Acer pseudoplatanus</i> juv.	r	I
<i>Fumaria officinalis</i>	r	I

Tab. 10. — *Conyzo-Cynodonetum dactyloni* (FELFÖLDY 1942) ELIÁŠ

Číslo zápisu — Relevé No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dátum — Date	9/9	3/9	3/9	20/9	20/9	21/9	9/9	1/9	9/9	Stálosť — Constancy
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	5	10	7	6	4	20	2	4	5	
Pokryvnosť (%) — Cover (%)	100	100	100	85	100	100	100	100	100	
Počet druhov — No. of species	9	9	10	9	10	13	13	16	15	
<i>Conyzo-Cynodonetum, Convolvulo-Agropyriion, Agropyretea repantis</i>										
<i>Cynodon dactylon</i>	5.5	5.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	4.5	5.5	V
<i>Convolvulus arvensis</i>	+	2.1	2.2	.	+	+	+	1.1	+	V
<i>Conyza canadensis</i>	.	+	.	.	r	+	r	.	r	III
<i>Chondrilla juncea</i>	+	+	.	.	.	(r)	.	.	+	II
<i>Agropyron repens</i>	.	.	+.2	I
<i>Lepidium draba</i>	.	r	I
<i>Falcaria vulgaris</i>	.	.	r	I
Sprievodné — Companions										
<i>Taraxacum officinale</i>	r	.	.	+	1.2	.	r	r	r	IV
<i>Rubus caesius</i>	+	+	.	.	.	1.1	.	+	r	III
<i>Artemisia vulgaris</i>	.	r	r	.	.	r	.	r	r	III
<i>Achillea millefolium</i>	.	.	.	+.2	.	.	+	+	r	II
<i>Setaria viridis</i>	+.2	+	r	.	r	II
<i>Polygonum aviculare</i>	.	.	.	+	+	.	r	1.1	.	II
<i>Atriplex tatarica</i>	r	.	r	+	.	II
<i>Chenopodium album</i>	.	.	.	+	r	.	.	r	.	II
<i>Lolium perenne</i>	.	.	.	2.2	+	.	.	r	.	II
<i>Pastinaca sativa</i>	+	+	.	.	.	I
<i>Medicago falcata</i>	+	.	r	I
<i>Daucus carota</i>	r	r	I
<i>Calamagrostis epigeios</i>	+	.	.	+	I
<i>Plantago lanceolata</i>	.	.	.	2.2	.	.	+	.	.	I
<i>Digitaria sanguinalis</i>	+.2	.	+.2	.	.	I
<i>Lactuca serriola</i>	.	.	r	r	.	I
<i>Amaranthus retroflexus</i>	.	.	r	.	+	I
<i>Setaria glauca</i>	+	.	.	I
<i>Linum usitatissimum</i>	+	.	.	I
<i>Saponaria officinalis</i>	.	.	2.1	I
<i>Atriplex patula</i>	.	.	+	I
<i>Plantago major</i>	.	.	.	+	I
<i>Cichorium intybus</i>	+	I
<i>Centaurea stoebe</i>	.	.	.	+	I
<i>Echium vulgare</i>	.	.	.	+	r	I
<i>Centaurea jacea</i>	r	I
<i>Setaria verticillata</i>	r	.	.	I
<i>Cirsium arvense</i>	r	.	.	I
<i>Carduus acanthoides</i>	r	I
<i>Geum urbanum</i>	.	r	I
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	r	.	.	I
<i>Reseda lutea</i>	r	.	.	.	I
<i>Sonchus oleraceus</i>	r	.	.	I
<i>Sambucus ebulus</i>	.	r	I
<i>Eryngium campestre</i>	r	.	.	.	I
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	r	.	I
<i>Robinia pseudo-acacia juv.</i>	r	.	.	.	I
<i>Ailanthus glandulosa juv.</i>	r	.	.	.	I

nónskej oblasti. FELFÖLDY (1942) zahrnul do *Cynodon dactylon*-Ass. aj čiastočne zošlapované porasty.

V Trnave sa spoločenstvo vyskytuje predovšetkým na železničných stanovištiach v priestore železničnej stanice, ale i blízko trate nedaleko sladovne. Tu porastá v súvislých hustých lemoch okraje trate, ale i plochy priamo na odstavných kolajach. Stanovišťa sú výlučne suché, teplé a výhrevné. Substrát je prieplustný a skeletnatý.

Štruktúru spoločenstva určuje konkurenčne silný a dynamický druh *Cynodon dactylon*, ktorý výrazne dominuje. Z ostatných druhov len *Convolvulus arvensis*, *Taraxacum officinale*, *Rubus caesius*, *Conyza canadensis* a *Artemisia vulgaris* majú vyššiu stálosť, ale fyziognomicky sa významnejšie neuplatňujú (tab. 10). Druhy zošlapovaných spoločenstiev zväzu *Polygonum aviculare* a triedy *Plantaginetea* chýbajú, alebo sa vyskytujú len vzácne a s malými hodnotami abundance a dominancie. Počet druhov v spoločenstve sa pohybuje od 9 do 16 (priemer 12). Silne prevládajú viacročné druhy; terofytov je len 29 % (obr. 3).

Conyzo-Cynodonetum ako pionierske poloruderálne teplomilné spoločenstvo panónskeho charakteru zaradujeme do zväzu *Convolvulo-Agropyriion repentis* GÖRS 1966. Zodpovedá tomu okrem fyziognomie a ekológie spoločenstva aj jeho nadzemná biomasa. ELIÁŠ (1976) zistil pre tieto typy porastov sezónne maximá biomasy v rozmedzí 0,7 – 0,9 kg/m², čo sú hodnoty veľmi blízko tým, ktoré zistil pre *Convolvulo-Agopyretum* (okolo 0,9 kg/m²). Zošlapované spoločestvá dosahovali najviac ak 0,5 kg/m² (napr. menej šlapané porasty *Plantagini-Lolietum*).

Zošlapované porasty s dominujúcim druhom *Cynodon dactylon* je možné hodnotiť ako subasociáciu *Lolio-Plantaginetum* BEGER 1930 *cynodonetosum* R. TÜXEN 1950 alebo pri výraznej dominantnej tohto druhu ako *Cynodon-Plantaginetum* (GAMS 1927) BRUN-HOOL 1962. Ostatné typy porastov nie je možné zaradovať do zväzu *Polygonion aviculare* a je treba hľadať ich vztahy k iným syntaxónom.

10. *Eragrostio-Polygonetum avicularis* OBERDORFER 1954

Eragrostio-Polygonetum je dosť rozšíreným spoločenstvom na zošlapovaných železničných stanovištiach v celom Československu. GRÜLL (1971) ho uvádzia z Brna, PYŠEK (1974) z Plzne a HEJNÝ et JEHLÍK (1975) sa zmenšujú o jeho výskyt v severných a východných Čechách. Spoločenstvo sa vyskytuje na väčsine železničných staníc na celom západnom Slovensku. ELIÁŠ (1977a) uvádzia fytocenologické zápisu zo Sereďe a z Bratislav. Miestami je hojný na zošlapovaných stanovištiach mestských a dedinských sídel (najmä v Podunají).

Stanovištiami tohto zošlapovaného spoločenstva sú prieplustné, piesočnaté až piesočnato-hlinité pôdy. Preto sa v Trnave vyskytuje takmer výlučne na železničnej stanici a vo Vozovke. Mimo železničných stanovišť sme ho naznamenali len v niekoľkých uliciach blízko stanice na okrajoch chodníka, v štrbinách medzi betónovými krajníkmi a asfaltovanou plochou.

Charakteristickými druhmi tohto spoločenstva sú *Eragrostis minor* a *Digitaria sanguinalis*, ktoré spolu s *Polygonum aviculare* majú aj najvyššiu triedu stálosti (tab. 11). V spoločenstve silne prevládajú jednoročné druhy (65 %). Väčšie zastúpenie druhov triedy *Chenopodieta* medzi sprievodnými druhmi

Tab. 11. — *Eragrostio - Polygonetum avicularis* OBERDORFER 1954

Číslo zápisu — Relevé No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—
Dátum — Date	7/9	23/8	23/8	3/9	9/9	7/9	9/9	7/9	9/9	7/9	Stálosť — Constantey
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	6	1,5	3	2	1	1,7	1,2	2,6	1,8	5,6	
Pokryvnosť (%) — Cover (%)	40	40	60	60	60	40	80	50	90	80	
Počet druhov — No. of species	7	6	7	6	6	8	9	13	13	14	

<i>Eragrostio-Polygonetum</i>											
<i>Eragrostis minor</i>	2.2	3.2	3.2	3.2	1.2	2.2	4.4	2.2	2.2	2.2	V
<i>Digitaria sanguinalis</i>	+	+.2	1.2	+.2	r	+.2	+	1.2	+	2.2	V
<i>Polygonion, Plantaginetea</i>											
<i>Polygonum arenastrum</i>	2.2	+.2	2.2	2.2	3.3	+.2	1.2	1.2	4.4	3.4	V
<i>Lolium perenne</i>	1.2	1.2	+.2	+.2	+.2	+.2	III
<i>Plantago major</i>	.	+.2	(r)	.	+	II
<i>Trifolium repens</i>	(r)	.	+	II
<i>Cichorium intybus</i>	r	.	.	I
<i>Poa annua</i>	r	I
<i>Lepidium ruderale</i>	r	I
<i>Sprievodné — Companions</i>											
<i>Amaranthus retroflexus</i>	.	r	.	.	r	+	+	.	r	.	III
<i>Setaria viridis</i>	.	.	r	.	.	+	.	+	.	.	II
<i>Achillea millefolium</i>	+	.	.	.	r	r	II
<i>Sonchus oleraceus</i>	r	.	(r)	r	.	.	II
<i>Atriplex tatarica</i>	1.2	.	1.2	.	.	I
<i>Taraxacum officinale</i>	r	1.2	I
<i>Conyza canadensis</i>	.	.	+	+	I
<i>Convolvulus arvensis</i>	+	+	I
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	+.2	.	.	r	.	.	I
<i>Amaranthus albus</i>	+.2	.	r	.	.	I
<i>Setaria verticillata</i>	1.2	+	I
<i>Salsola cali</i>	r	.	r	.	.	I
<i>Brassica napus</i>	r	.	r	.	.	I
<i>Chenopodium album</i>	(r)	r	.	I
<i>Chenopodium strictum</i>	r	I
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	.	.	r	I
<i>Plantago lanceolata</i>	.	.	.	r	I
<i>Amaranthus blitoides</i>	r	.	.	I
<i>Echium vulgare</i>	.	.	.	r	I
<i>Daucus carota</i>	r	I
<i>Chenopodium vulvaria</i>	r	.	.	.	I
<i>Medicago lupulina</i>	r	.	.	I
<i>Senecio vulgaris</i>	r	.	I
<i>Fallopia convolvulus</i>	r	.	I
<i>Artemisia vulgaris</i>	r	.	I

naznačuje blízky vzťah k asociácii *Panico-Eragrostietum* R. TÜXEN (1942) 1950.

Eragrostio-Polygonetum popísal OBERDORFER (1954) z Balkánskeho poloostrova. Fytocenologický materiál bol doteraz publikovaný zo strednej a južnej Európy. Vyskytuje sa napr. v NSR (OBERDORFER 1957 a.), v NDR (GUTTE 1972, GUTTE et HILBIG 1975), v Poľsku (FIJALKOWSKI 1967, ROSAŃSKI et GUTTE 1971 a.), v Maďarsku (FELFÖLDY 1942), v Rumunsku (MORARIU 1943) a inde.

Tab. 12. — *Plantagini-Lolietum perennis* BEGER 1930

Číslo zápisu — Relevé No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dátum — Date	27/7	7/9	15/6	20/5	13/6	20/5	5/6	28/6	20/5	3/9	Stalosť — Constancy
Plocha (m ²) — Plot area (m ²)	6	6	4	10	8	4	2,5	5	3	3	
Pokryvnosť (%) — Cover (%)	40	40	60	70	90	95	90	85	90	90	
Počet druhov — No. of species	6	8	8	10	10	10	11	12	13	17	

<i>Plantagini-Lolietum</i>											
<i>Lolium perenne</i>	1.2	2.2	+.2	4.4	2.2	2.2	3.2	4.4	3.3	3.3	V
<i>Polygonion, Planataginetea</i>											
<i>Plantago major</i>	r	2.2	2.2	1.2	1.2	2.2	2.2	1.2	1.2	1.2	V
<i>Polygonum arenastrum</i>	3.2	2.2	2.2	.	1.2	4.4	+	+	2.2	3.3	V
<i>Poa annua</i>	.	+.2	+.2	.	3.3	1.2	2.2	.	3.3	.	III
<i>Matricaria discoidea</i>	.	.	.	+	1.1	2.1	r	+	r	.	III
<i>Lepidium ruderale</i>	r	.	+	+	+	+	+	.	.	.	III
<i>Trifolium repens</i>	.	+	2.2	.	+	II
<i>Cichorium intybus</i>	+	I
<i>Bryum argenteum</i>	2.3	.	.	.	I
Sprievodné — Companions											
<i>Hordeum murinum</i>	.	.	1.2	+	+	1.2	1.2	r	+.2	.	IV
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	r	.	.	+	+	2.2	1.2	.	r	r	IV
<i>Taraxacum officinale</i>	+	.	.	1.2	.	r	+	+	+	+	IV
<i>Achillea millefolium</i>	.	r	.	+.2	.	.	.	+.2	.	1.2	II
<i>Poa pratense</i>	.	.	.	r	.	r	.	+.2	.	.	II
<i>Dactylis glomerata</i>	+.2	+.2	+	II
<i>Chenopodium album</i>	.	r	r	.	r	II
<i>Convolvulus arvensis</i>	.	.	1.2	+	I
<i>Plantago lanceolata</i>	.	r	+	.	.	I
<i>Anthemis cotula</i>	.	.	r	r	I
<i>Arctium sp. juv.</i>	r	.	.	.	r	.	I
<i>Stellaria media</i>	+	.	I
<i>Polygonum persicaria</i>	+	I
<i>Artemisia vulgaris</i>	+	I
<i>Bromus tectorum</i>	r	.	.	.	I
<i>Malva neglecta</i>	r	.	I
<i>Sonchus oleraceus</i>	.	.	.	r	I
<i>Sisymbrium loeselii</i>	r	.	I
<i>Amaranthus retroflexus</i>	r	I
<i>Lepidium draba</i>	r	I
<i>Medicago lupulina</i>	r	I
<i>Rubus fruticosus</i>	(+)	I

11. *Lolio-Plantaginetum majoris* BEGER 1930

Toto spoločenstvo je hojne rozšírené na zošlapovaných pôdach v celej ČSSR. Prvý fytocenologický materiál publikoval JURKO (1967) zo severozápadného Slovenska. GRÜLL (1971) uvádza toto spoločenstvo z Brna a HEJNÝ (1971) z Prahy. Materiál z Malaciek podrobne analyzovala KRIPELOVÁ (1972). Vela fytocenologického materiálu zo západných a severných Čiech priniesol PYŠEK (1972, 1973a, b, 1974). HEJNÝ (1974) ho uvádza z južných Čiech a ELIÁŠ (1974) z Horného Požitavia. ŠANDOVÁ (1976) ho sledovala v obci Holoubkov (západné Čechy). Autor článku má rozsiahly materiál z celého západného Slovenska.

V Trnave sa *Plantagini-Lolietum* vyskytuje na zošlapovaných pôdach ako vo štvrtiach vnútorného starého mesta, tak aj v obvodových štvrtiach. Porastá plochy na nespevnených cestách, chodníkoch, šlapané plochy medzi obytnými blokmi, ihriská a pod.

Štruktúra spoločenstva je typická pre zošlapované spoločenstvá. Druhovo chudobné porasty (priemerný počet druhov v zápise je 10,5) formujú vytrvalé druhy *Lolium perenne* a *Plantago major* ako charakteristické druhy asociácie (tab. 12). Jednoročné druhy zväzu *Polygonion avicularis* (*Polygonum arenastrum*, *Poa annua*, *Matricaria discoidea* a *Lepidium ruderale*) vyplňujú často veľké plochy medzi nimi. V spoločenstve sú popri hemikryptofytach (39 %) hojne zastúpené aj terofyty (až 52 %).

V spoločenstve je možné odlišiť variant s *Hordeum murinum*. Podobne aj v Maďarsku (FELFÖLDY 1942) a v Malackách (KRIPPELOVÁ 1972) vstupuje *Hordeum murinum* do týchto zošlapovaných spoločenstiev. Pri zoslabení zošlapu môžu porasty variantu s *Hordeum murinum* prechádzať i do *Bromo-Hordeetum murini lolietosum* KNAPP 1961, ale rovnako môžu byť aj výsledkom obrátenej sukcesie pri zosilnení zošlapu.

Spoločenstvo je veľmi hojne rozšírené po celej Európe. Doteraz bolo publikovaného veľa fytoecenologického materiálu prakticky zo všetkých európskych krajín. O nové hodnotenie širokej variabilitu zošlapovaných spoločenstiev v európskom meradle sa v poslednej dobe pokúsili SISSINGH (1969) a RIVAS-MARTÍNEZ (1975).

SYNTAXONOMICKÝ PREHĽAD ANALYZOVANÝCH SPOLOČENSTIEV MESTA TRNAVY¹⁾

Sisymbrietea GUTTE et HILBIG 1975

Sisymbrietalia officinalis J. TÜXEN 1961 em. GÖRS 1966

Sisymbrium officinalis R. TÜXEN, LOHMEYER et PREISING 1950

Bromo (sterilis) — Hordeetum murini (ALLORGE 1922) LOHMEYER 1950

B. — H. typicum

B. — H. sisymbrietosum loeselii ELIÁŠ 1977

B. — H. lolietosum perennis KNAPP 1961

Sisymbrium sophiae KREH 1935

Sisymbrium loeselii GUTTE 1972

Erigeron-Lactucetum serriolae LOHMEYER 1950 ap. OBERDORFER 1957

Atriplicetum nitens KNAPP 1945

Chenopodietum stricti OBERDORFER 1957

Atriplicetum tataricae UBRIZSY 1949

 facies s *Artemisia annua*

Ivaetum xanthiifoliae FIJALKOWSKI 1967

Spoločenstvo so *Sisymbrium orientale*

Spoločenstvo s *Chenopodium ficifolium*

Artemisieta vulgaris LOHMEYER, PREISING et R. TÜXEN 1950

Artemisieta vulgaris LOHMEYER ap. R. TÜXEN 1947

Arction R. TÜXEN (1937) 1947 em. GUTTE 1972

Sambacetum ebuli FELFÖLDY 1942

S. e. typicum ELIÁŠ 1978

S. e. brometosum inermis ELIÁŠ 1978

¹⁾ Do prehľadu sú okrem syntaxónov opisovaných v tejto práci zahrnuté aj spoločenstvá uvedené v predchádzajúcej práci (ELIÁŠ 1977b).

Onopordetalia acanthii BRAUN-BLANQUET et R. TÜXEN 1943
Dauco-Melilotion GÖRS 1966

Echio-Melilotetum albi R. TÜXEN 1942

Agropyretea intermedii-repentis OBERDORFER, TH. MÜLLER et GÖRS ap.
OBERDORFER et al. 1967

Agropyretalia intermedii-repentis OBERDORFER, TH. MÜLLER et GÖRS ap.
OBERDORFER et al. 1967

Convolvulo-Agopyrion intermedii-repentis GÖRS 1966

Agropyretum repens FELFÖLDY 1942

Conzyo-Cynodonetum dactyloni (FELFÖLDY 1942) ELIÁŠ 1978

Plantaginetea majoris R. TÜXEN (1947) 1950

Plantaginetalia majoris R. TÜXEN (1947) 1950

Polygonion avicularis BRAUN-BLANQUET 1931

Sclerochloo-Polygonetum avicularis (GAMS 1927) SOÓ 1940

Eragrostio-Polygonetum avicularis OBERDORFER 1954

Plantagini-Lolietum perennis BEGER 1930

variant typický

variant s *Hordeum murinum*

SÚHRN

V práci sa na základe 110 fytocenologických zápisov analyzuje ďalších 12 syntaxónov rundernej vegetácie v meste Trnave (juhozápadné Slovensko), ktoré leží v panónskej floristickej oblasti. Pri každom spoločenstve autor stručne uvádza súčasné poznatky o jeho rozšírení v Česko-slovensku (na základe publikovaných prác) s dôrazom na Slovensko, jeho výskyt v meste Trnave, stanovišta, floristické zloženie, synmorfológiu, synekológiu a variabilitu v sledovanom území a konečne synchorológiu spoločenstva v Európe. Uvádzajúce spoločenstvá:

1. *Sambucetum ebuli* FELFÖLDY 1942 sa vyskytuje na svahoch železničnej trate, ktorá prechádza mestom, v dvoch subasociáciach *S. e. typicum* ELIÁŠ 1978 (vysoké porasty s úplnou dominanciou charakteristického druhu) a *S. e. brometosum inermis* ELIÁŠ 1978 (zatravnené nižšie porasty na suchších pôdach).

2. *Echio-Melilotetum albi* R. TÜXEN 1942 na prieplustných substrátoch (štŕk a piesok) v priestore železničnej stanice a na obnažených suchých skeletnatých pôdach v Hlbokej.

3. *Erigerio-Lactucetum serriolaе* LOHMEYER 1950 apud OBERDORFER 1957 na opustených plochách v okolí stavenísk, v zahradách a na navážkach.

4. *Atriplicetum nitentis* KNAPP 1945 na čerstvých navážkach zeminy v obvodových štvrtiach mesta.

5. *Atriplicetum tataricae* UBRIZSY 1949 na čerstvých navážkach zeminy, svahoch kalových polí a na obnažených pôdach blízko ciest a železničnej trate. Do porastov vstupujú *Iva xanthiifolia* a *Artemisia annua*, ktoré tu vytvárajú fácie.

6. *Ivaetum xanthiifoliae* FIJAŁKOWSKI 1967 vytláča na čerstvých pôdach iné spoločenstvá zväzu *Sisymbrium*. Objavilo sa len v posledných rokoch.

7. *Chenopodieturn stricti* OBERDORFER 1957 sa ako pionierske spoločenstvo vyskytuje na čerstvých navážkach v blízkosti novostavieb a inde. Podľa prevládnutia druhov vytvára varianty s *Chenopodium album*, s *Amaranthus retroflexus* a s *Chenopodium ficifolium*. Porasty s dominujúcim *Chenopodium ficifolium* bez charakteristických druhov tohto spoločenstva na výzivných substrátoch (saturačné kaly) vyčleňujem predbežne ako spoločenstvo s *Chenopodium ficifolium*.

8. *Agropyretum repens* FELFÖLDY 1942 porastá opustené obnažené suché pôdy v obvodových štvrtiach mesta.

9. *Conzyo-Cynodonetum dactyloni* (FELDFÖLDY 1942) ELIÁŠ 1978 zahrňuje nezošlapované porasty s dominujúcim *Cynodon dactylon* na železničných stanovištiach a okrajoch ciest v celej panónskej oblasti. Vzhľadom na jeho synmorfológiu a ekológiu bolo zaradené do zväzu *Convolvulo-Agopyrion repens* GÖRS 1966.

10. *Eragrostio-Polygonetum avicularis* OBERDORFER 1954 sa vyskytuje takmer výlučne na zošlapovaných železničných stanovištiach v priestore železničnej stanice.

11. *Plantagini-Lolietum perennis* BEGER 1930 sa vyskytuje na zošlapovaných pôdach v celom meste. Prevládajú porasty variantu s *Hordeum murinum*.

SUMMARY

On the basis of 110 phytosociological records, an analysis is made of 12 syntaxa of ruderal vegetation in the town Trnava (SW. Slovakia, Panonian floristic region). For each community, the following data are given: distribution in Czechoslovakia with regard to Slovakia (based on published papers), distribution in the town, habitats, species composition, synmorphology, synecology a variability in the investigated site and synchorology of the community in Europe. The following associations are described:

1. *Sambucetum ebuli* FOLFÖLDY 1942, occurring on slopes of railway embankments, is present in two subassociations: *S. e. typicum* ELIÁŠ 1978 (high stands with total dominance of the characteristic species) and *S. e. brometosum inermis* ELIÁŠ 1978 (lower stands on drier soils with grasses present).

2. *Echio-Melilotetum albi* R. TÜXEN 1942 on permeable substrates (gravel and sand) within the railway station and on bare, dry, stony soils at Hlboká.

3. *Eriger-Lactucetum serriolaie* LOHMEYER 1950 apud OBERDORFER 1957 in abandoned areas in the surroundings of building sites, in gardens and on heaps.

4. *Atriplicetum nitentis* KNAPP 1945 on newly accumulated ground heaps in the outskirts of the town.

5. *Atriplicetum tataricae* UBRISZ 1949 on fresh ground heaps, on embankments of mud basins and on bare soils near road and railways. The species *Iva xanthiifolia* and *Artemisia annua* penetrate into this association, producing facies.

6. *Ivaetum xanthiifoliae* FIJALKOWSKI 1967 displaces other communities of the alliances *Sisymbriion* and *Arction* on fresh soils. It has appeared only recently.

7. *Chenopodietum stricti* OBERDORFER 1957 as initial community occurs on fresh heaps near building sites and elsewhere. The following variants were distinguished according to the predominating species: variant with *Chenopodium album*, variant with *Amaranthus retroflexus* and variant with *Chenopodium ficifolium*. The stands with dominant *Chenopodium ficifolium* lacking characteristic species of this association and occurring on rich substrata (saturation dregs) were preliminary distinguished as community with *Chenopodium ficifolium*.

8. *Agropyretum repantis* FELFÖLDY 1942 occupies abandoned, bare, dry soils in the outskirts of the town.

9. *Conyzo-Cynodonetum dactyloni* (FELFÖLDY 1942) ELIÁŠ 1978 includes not-trodden stands with dominant *Cynodon dactylon* on railway habitats and road verges in the whole Panonian region. With regard to its synmorphology and synecology it is referred to the alliance *Convolvulo-Agropyriion repantis* GÖRS 1966.

10. *Eragrostio-Polygonetum avicularis* OBERDORFER 1954 occurs only on trodden sites within the railway station.

11. *Lolio-Plantaginetum majoris* BEGER 1930 occurs on loamy, frequently trodden soils in the whole town. Stands of the variant with *Hordeum murinum* predominate.

LITERATÚRA

- AELLEN P. (1972): Das Vorkommen einer neuen Hybride von *Chenopodium ficifolium* Sm. × *Chenopodium viride* L. (*Chenopodium* × *gruelli* Aellen hybr. nova) in der ČSSR. — Acta Mus. Morav., Brno, Sci. Natur. 66–67 : 167–170.
- ANIOŁ-KWIATKOWSKA J. (1974): Flora i zbiornowiska synantropijne Legnicy, Lubina i Polkowic. — Acta Univ. Wratisl., Wrocław, 229, Prace Bot. 19 : 1–152.
- BRAUN-BLANQUET J. (1951): Pflanzensoziologie. — Wien.
- COSTE I. (1975): Contribution à l'étude de la végétation anthropogéne dans les monts de Ločava (sud-ouest de la Roumanie) I. — Doc. Phytosoc., Lille, 9–14 : 63–71.
- EHRENDORFER F. (1973): Liste der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Ed. 2. Stuttgart.
- ELIÁŠ P. (1974): Niektoré synantropné spoločenstvá Horného Požitavia. — Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1 : 197–211.
- (1976): Shoot biomass of the ruderal plant communities at human settlements. — MS. [Prednesené na sympóziu „Synantropná flóra a vegetácia III“ v septembri 1976 v Bratislave.]
- (1977a): Poznámky k lokalitám *Tribulus terrestris* subsp. *orientalis* na železničných stanovištiach západného Slovenska. — Zpr. Čs. Bot. Společ. Praha, 12 : 127–129.
- (1977b): Jarné efemérne ruderálne spoločenstvá Trnavy. — Biológia, Bratislava, 32: 11–23.
- (1978): Bohatá lokalita Echio-Melilotetum albi v Bratislave-Novom Meste. — Biológia, Bratislava, 33.
- FALIŃSKI J. B. (1966): Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik syntropizacji naturalnego kompleksu leśnego. — Diss. Univ. Varsov., Warszawa, 13 : 1–256.

- FELFÖLDY L. (1942): Szociológiai vizsgálatok a pannóniai flóraterület gyomvegetációján. — Acta Geobot. Hung., Budapest, 5 : 87—140.
- FIJALKOWSKI D. (1967): Zbiorowiska roślin synantropijnych miasta Lublina. — Ann. Univ. M. C. Skłod., Lublin, sec. C, 22 : 195—233.
- FRANTOVÁ J. (1947): Plevelová, ruderálna a adventívna flóra okolia Trnavy. — Prírod. Sborn., Prievidza, 2 : 153—248.
- GÖRS S. (1966): Die Pflanzengesellschaften der Rebhänge am Spitzberg. In: Der Spitzberg bei Tübingen. — Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, 3 : 476—534.
- GRÜLL F. (1971): Synantropní společenstva, jejich vývojová stadia, sukcese a dynamika na skládkách a rumištích města Brna. — Zborn. Predn. Zjazdu Slov. Bot. Spoloč., Tisovec 1970, p. 569—577. — Bratislava.
- GRÜLL F. et S. PRISZTER (1973): Amaranthus × soproniensis Priszter et Kárpáti, eine interessante Hybride auch in der Tschechoslowakei. — Preslia, Praha, 45 : 151—153.
- GUTTE P. (1972): Ruderalpflanzengesellschaften West- und Mittelsachsens — Fedd. Repert., Berlin, 83 : 11—122.
- GUTTE P. et W. HILBIG (1975): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. XI. Die Ruderalvegetation. — Herencinia, Ser. n., Leipzig, 12 : 1—39.
- HEJNÝ S. (1958): Iva xanthiiifolia Nutt. v ČSR. — Acta Facult. Rer. Natur. Univ. Comen., Bratislava, Botanica, 2 : 323—342.
- (1971): Metodologický příspěvek k výzkumu synantropní květeny a vegetace velkoměsta (na příkladu Prahy). — Zborn. Predn. Zjazdu Slov. Bot. Spoloč., Tisovec 1970, p. 545—567. — Bratislava.
 - (1974): Příspěvek k charakteristice ruderálních společenstev v jižních Čechách. — Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1 : 213—232.
- HEJNÝ S. et V. JEHLÍK (1975): Herniarium glabrae (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975 eine wenig bekannte Assoziation der Verbandes Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931, in der Tschechoslowakei. — Phytocoenologia, Stuttgart-Lehre, 2 : 100—122.
- HILBERT H. (1971): Poznámky k osídlovaniu mestských smetisk vegetáciou. — Zborn. Predn. Zjazdu Slov. Bot. Spoloč., Tisovec 1970, Bratislava, p. 525—544.
- JURKO A. (1967): Príspevok k spoločenstvám sväzu Polygonion avicularis Br.-Br. 31 zo severo-západného Slovenska. — Biológia, Bratislava, 22 : 610—615.
- KRIPPELOVÁ T. (1969): Verbreitung der Iva xanthiiifolia Nutt. und ihr Vorkommen in den Pflanzengesellschaften in der ČSSR. — Biológia, Bratislava, 24 : 738—759.
- (1972): Ruderálne spoločenstvá mesta Malacky. — Biol. Práce, Bratislava, 18 (1) : 1—120.
- LEBRUN I., A. NOIRFALISE, P. HEINEMANN et C. VANDEN BERGHEN (1949): Les associations végétales de Belgique. — Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 82.
- LUKNIŠ M. [red.] (1972): Slovensko 2 — Príroda. — Bratislava.
- MARKOVIĆ-GOSPODARIĆ L. (1965): Prilog poznavanju ruderalne vegetacije kontinentalnih dijelova Hrvatske. — Acta Bot. Croat., Zagreb, 24 : 91—136.
- MORARIU J. (1943): Asociații de plante antropofile din jurul bucureștilor cu observații asupra răspândirii lor în țară și mai ales în Transilavnia. — Bull. Jard. et Mus. Bot. Univ. Cluj, Timișoara, 23 : 131—211.
- MUCINA L. (1976): Erigeron-Lactucetum serriolae Lohm. 1950 apud Oberd. 1957 na ruderálnych stanovištiach mesta Piešťany. — MS. [Prednesené na sympóziu „Synantropná flóra a vegetácia III.“ v septembri 1976 v Bratislave.]
- OBERDORFER E. (1954): Über Unkrautgesellschaften der Balkanhalbinsel. — Vegetatio, Haag, 4 : 379—410.
- (1957): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. — Pflanzensoziol., Jena, 10.
- PASSARGE H. (1964): Pflanzengesellschaften des norddeutschen Flachlandes. Teil I. — Pflanzensoziol., Jena, 13.
- PETROVIĆ Š. [red.] (1968): Klimatické a fenologické pomery Západoslovenského kraja. — Praha.
- PIGNATTI S. (1954): Introduzione allo studio fitosociologico della pianura veneta orientale. — Arch. Bot., 28 : 301—320.
- POVINCOVÁ E. (1974): Priestorová skladba polnohospodárstva. — In: LUKNIŠ M. et J. PRINC [red.], Slovensko 3, Lud — I. časť, p. 101—148.
- PYŠEK A. (1972): Ein Beitrag zur Kenntnis der Ruderalvegetation der Stadt Sušice (Westböhmien). — Fol. Mus. Rer. Natur. Bohem. Occident., Botanica, Plzeň, 2 : 1—33.
- (1973a): Přehled ruderálních společenstev obce Vroutek v okrese Louny. — Severočes. Přír., Litoměřice, 4 : 1—35.
 - (1973b): Ruderální vegetace obce Úloch v okrese Klatovy. — Zpr. Mus. Západočes. Kraje, Plzeň, Příroda 15 : 7—18.
 - (1974): Kurzgefasste Übersicht der Ruderalvegetation von Plzeň und seiner nahen Umgebung. — Fol. Mus. Rer. Natur. Bohem. Occident., Botanica, Plzeň, 4 : 1—41.

- RIVAS-MARTÍNEZ S. (1975): Sobre la nueva clase Polygono-Poetea annuae. — *Phytocoenologia*, Stuttgart-Lehre, 2 : 123—140.
- ROSTAŃSKI K. et P. GUTTE (1971): Roślinność ruderalna miasta Wrocławia. — Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. U. W., Warszawa-Białowieża, 27 : 167—215.
- SISSINGH G. (1950): Onkruid-associaties in Nederland. — s'Gravenhage.
- (1969): Über die systematische Gliederung von Trittpflanzen-Gesellschaften. — Mitt. Flor.-soz. Arbgem., Ser. n., Stolzenau-Wesser, 14 : 179—192.
- SOÓ R. (1961): Systematische Übersicht der pannonicischen Pflanzengesellschaften III. — Acta Bot. Hung., Budapest, 7 : 425—450.
- SOWA R. (1971): Flora i roślinne zbiorowiska ruderalne na obszarze Wojevództwa Łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem miast i miasteczek. — Łódź.
- ŠANDOVÁ M. (1976): Ruderální vegetace obce Holoubkov v okrese Rokycany. — Zpr. Muz. Západočesk. Kraj., Plzeň, Příroda 19 : 41—56.
- TÜXEN R. (1950): Grundriss einer Systematik der nitrophilen Unkrautgesellschaften in der Eurosibirischen Region Europas. — Mitt. Flor.-soz. Arbgem., Ser. n., Stolzenau-Wesser, 2 : 93—175.
- VARSIK B. (1975): Vznik Trnavy a rozvoj mesta v stredoveku. — Trnavský Zborn. Bratislava, 1 : 9—29.
- VEREŠÍK J. (1974): Geografická charakteristika väčších miest Slovenska. — In: LUKNÍŠ M. et J. PRINC [red.], Slovensko 3, Eud — I. časť, p. 628—636.
- ZAJAC E. U. (1974): Ruderal vegetation of the Bielsko-Biala town. — Monogr. Bot., Warszawa, 40 : 1—87.

Došlo 22. decembra 1976