

Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch

Beitrag zur Kenntnis der nitrophilen Saumgesellschaften des Javorníky-Gebirges

Eva Fajmonová

FAJMONOVÁ E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. [Notes on nitrophilous fringe communities of the Javorníky Mountains.] – Preslia, Praha, 52 : 333 – 345.

Nitrophilous fringe communities of the class *Galio-Urticetea* Pass. 67 em. KOPECKÝ 69 in the Javorníky Mts. were investigated. The present paper discusses riparian fringe phytocoenoses in the submontane belt. Natural stands are referred to the subassociation *Petasitetum hybridi typicum* KOPECKÝ 69 of the alliance *Petasition officinalis* SILL. 33 em. KOPECKÝ 69. These phytocoenoses belong to the Sudeten-Carpathian race. Anthropophilous stands are referred to the association *Chaerophylletum aromatici* (Tx. 67) NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69 of the alliance *Aegopodium podagrariae* Tx. 67 em. GUTTE 72. Two subassociations are recognized: *Ch. a. typicum* (Tx. 67) NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69 and *Ch. a. chaerophylletosum hirsuti* NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69.

Botanická záhrada PFUK, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 11, 816 00 Bratislava, Česko-slovensko.

ÚVOD

Nitrofilné lemové spoločenstvá sú v strednej Európe známe z prác viacerých autorov (TÜXEN 1967, PASSARGE 1967, NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ, NEUHÄUSL et HEJNÝ 1969, KOPECKÝ 1969, 1974a, b, Görs et MÜLLER 1969, NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ et NEUHÄUSL 1970, KOPECKÝ et HEJNÝ 1971, 1973, GUTTE 1972, HILBIG, HEINRICH et NIEMANN 1972, SISSINGH 1973, GRÜLL 1974, HADAČ 1978a, b a iní). Syntaxonomickú problematiku týchto spoločenstiev riešil u nás KOPECKÝ (1969, 1974).

Tento príspevok navázuje na práce uvedených autorov a prináša iba fytoценologický materiál z oblasti na moravsko-slovenskom pomedzí. Študovali sa vytrvalé nitrofilné fytocenózy, sprevádzajúce potoky v pohorí Javorníky. Výskum bol na oboch stranach pohoria obmedzený iba na horné toky v uzáveroch dolín, v nadmorskej výške cca 530 – 650 (700) m, prevažne v hornom submontánnom stupni.

Javorníky sú súčasťou flyšového pásma vonkajšieho okraja Západných Karpát. Klimaticky patrí študované územie pod hlavným rozvodovým hrebeňom do oblasti mierne teplej, veľmi vlhkej, vrchovinovej, s priemerným ročným úhrnom zrážok 900 – 1000 mm a priemernou ročnou teplotou 6 – 7 °C (údaje sú podľa Atlasu podnebia ČSR). Po geologickej stránke je územie dosť homogónne, buduje ho pieskovec magurského flyša.

Hoci sa Javorníky vyznačujú rozsiahlym osadníckym osídlením, horné časti dolín sú hospodársky málo narušené, pretože silnejšie anthropické vplyvy začínajú až v areáloch obcí v stredných častiach dolín a vyššie v údoliach iba v blízkosti rozptýlených usadlostí. Druhové zloženie fytocenóz častejšie zaplavovaných brehových valov možno tu preto považovať za veľmi blízke prirodzenému. Fytocenózy vyššie položených brehových stupňov sú však anthropogénne, pretože sú v kontakto so spoločenstvami lúčnymi a so spoločenstvami zošľapovaných pôd na okrajoch ciest, ktoré údoliami vedú paralelne s vodným tokom, často v jeho tesnej blízkosti. Získaný študijný materiál zachytáva len pobrežné lemové fytocenózy. Lemové spoločenstvá iných stanovišť sa tu neuvádzajú.

Článok venujem na pamiatku mojej matke † Ludmile Fajmonovej, ktorej vdačím za podnet k štúdiu vegetácie Javorníkov a za podnet k štúdiu botaniky vôbec.

Tab. 1. — *Petasitetum hybidi typicum* KOPECKÝ 69

Význačné a diferenciálne druhy zväzové a radové — Kenn- und Trennarten des *Petasition officinalis* und der *Petasito-Chaerophylletalia Petasites hybridus* (L.) G. M.

et SCH.	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	V	
<i>Chaeophyllum hirsutum</i> L.	2	1	1	2	2	1	2	2	2	+	1	2	3	2	1	2	2	1	3	.	1	1	1	2	2	2	1	1	V
<i>Stellaria nemorum</i> L.	2	1	1	2	1	1	2	1	2	+	2	2	2	2	1	2	+	1	2	+	3	2	2	2	1	.	+	.	V
<i>Primula elatior</i> (L.) HILL	1	1	1	.	+	1	+	1	1	1	1	1	1	1	1	.	+	1	1	1	1	1	.	1	+	1	.	1	V
<i>Agropyron caninum</i> (L.) P.B.	.	.	1	1	2	1	.	1	1	+	1	1	1	1	+	1	1	1	+	1	1	1	+	1	1	1	+	V	
<i>Carduus personata</i> (L.) JACQ.	+	+	+	+	.	+	+	.	+	r	.	+	II		

Diferenciálny druh geografickej rasy — Trennart der geogr. Rasse

Chaerophyllum aromaticum L. 1 1 1 2 1 1 1 1 + 2 2 1 1 2 1 2 2 1 + 2 1 1 1 + 1 1 1 + + 1 1 V

Diferenciálne druhy variantu – Trennarten der Variante

Význačné a diferenciálne druhy triedne — Kenn- und Trennarten der Galio-Urticetea

Tab. 1. — (Pokračovanie 1.)

Číslo zápisu — Nr. der Aufnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ostatné druhy — Übrige Arten

Tab. 1. — (Pokračovanie 2.)

Číslo zápisu — Nr. der Aufnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
e)	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	+	.	.	.	+	+	+	+	+	.	.	+	.	+	.	1	.	1	1	+	.	+	II		
	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	+	+	+	+	+	+	1	+	+	+	r	+	.	1	.	+	+	.	.	+	+	+	+	+	+	+	IV		
	<i>Dactylis glomerata</i> agg.	+	1	1	.	+	+	1	1	.	1	+	+	.	+	1	.	+	1	.	1	.	1	.	1	+	+	IV		
	<i>Alchemilla xanthochlora</i> ROTHM.	+	+	r	r	.	+	+	+	+	.	+	.	r	r	.	+	+	.	+	.	.	r	r	r	r	IV			
	<i>Geum rivale</i> L.	.	1	1	.	1	1	.	1	+	1	1	.	1	+	+	1	.	1	+	1	.	.	.	+	.	III			
	<i>Ajuga reptans</i> L.	1	1	.	1	1	.	+	.	+	.	+	.	.	r	+	+	.	+	1	r	.	.	+	1	.	III			
	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	.	+	1	1	.	.	+	+	+	1	+	.	1	+	1	1	.	III		
	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	+	.	+	+	+	.	+	+	.	.	1	.	+	r	+	+	.	+	+	.	r	+	+	.	III		
	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	+	+	1	+	.	.	+	+	+	.	r	1	.	.	+	+	.	r	+	+	r	r	III		
	<i>Taraxacum officinale</i> agg.	+	+	.	r	.	.	+	+	.	+	.	+	r	r	.	+	+	.	1	.	.	r	III		
	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	.	.	+	.	.	.	r	+	.	.	r	r	r	r	+	r	+	1	.	.	+	.	+	.	r	.	III		
	<i>Galium mollugo</i> L.	.	+	+	+	.	+	+	+	+	.	+	.	.	.	+	+	.	.	+	.	.	r	r	+	.	II			
	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	+	+	.	.	1	+	1	+	+	+	+	+	.	.	+	+	II			
	<i>Poa trivialis</i> L.	+	+	1	+	1	+	1	.	+	+	+	1	+	1	II			
	<i>Vicia sepium</i> L.	+	.	+	+	.	+	.	+	+	+	1	+	1	+	.	II		
	<i>Angelica sylvestris</i> L.	.	+	.	r	+	.	.	r	.	.	.	+	.	r	II		
	<i>Valeriana officinalis</i> L.	+	.	+	+	r	.	r	.	+	II			
	<i>Equisetum arvense</i> L.	+	r	.	.	r	.	+	r	.	r	+	.	r	r	.	II		
	<i>Cruciata glabra</i> (L.) EHREND.	+	.	+	+	+	+	.	.	+	1	.	1	.	+	+	I			
	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) SCOP.	.	.	+	.	.	1	1	.	1	.	+	+	I			
	<i>Anemone nemorosa</i> L.	1	+	1	+	I		
f)	<i>Ranunculus repens</i> L.	+	+	1	+	.	.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	.	+	.	+	+	+	+	+	+	+	IV		
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	.	.	.	1	.	.	+	.	1	.	.	.	+	.	1	+	1	.	+	.	+	II			

Druhy so zriedkavejším výskytom — Arten, die nur selten vorkommen: E1: *Mercurialis perennis* agg. (zápis — Aufnahme 14, 24, 26, 27), *Bromus benekenii* (LANGE) TRIMEN (26, 27, 30), *Acetosa alpestris* (Scop.) LÖVE (2, 10, 12), *Galeopsis speciosa* MILL. (7, 9, 25), *Melica nutans* L. (10, 14, 25), *Galeopsis tetrahit* L. (24, 29), *Luzula sylvatica* (Huds.) GAUD. (1, 2), *Aruncus dioicus* (WALTER) FERNALD (10, 13), *Senecio *jacquinianus* (RCHB.) ČELAK. (14, 15), *Scrophularia scopolii* HOPPE (1, 3), *Astrantia major* L. (1, 7), *Tithymalus dulcis* (L.) SCOP. (24, 29), *Actaea spicata* L. (10, 19), *Galium odoratum* (L.) SCOP. (13, 15), *Ranunculus ficaria* L. (9, 21), *Arctium tomentosum* MILL. (11, 17), *Geranium palustre* L. (19, 23), *Equisetum palustre* (L.) CR. (3, 19), *Agropyron repens* (L.) P.B. (16, 17), *Ranunculus platanifolius* L. (3), *Mycelis muralis* (L.) DUM. (26), *Dryopteris filix-mas* (L.) SCHOTT (15), *Acetosa pratensis* MILL. (26), *Poa pratensis* L. (7, 11), *Festuca pratensis* Huds. (17), *Ranunculus acris* L. (31), *Sympyrum officinale* L. (18), *Artemisia vulgaris* L. (17), *Geranium pratense* L. (29).

Vysvetlivky k tab. 1 — Erklärun gen zur Tab. 1:

- a) — diferenciálne druhy zvážu *Geo-Alliarion* — *Geo-Alliarion-Trennarten*
- b) — lesné druhy — Laubwaldarten der *Quero-Fagetea*
- c) — rúbaniskové druhy — Kahlschlagarten der *Epilobietea angustifolii*
- d) — druhy prameníš — Quellflurarten der *Montio-Cardaminetea*
- e) — lúčne druhy — Wiesenarten der *Molinio-Arrhenatheretea*
- f) — druhy zošlapovaných pôd — Trittrasenarten der *Plantaginetea majoris*

METODIKA

Pri analýze porastov a pri tabuľkovom spracovaní zápisového materiálu boli použité obvyklé metódy zúrišsko-montpellierskej školy (BRAUN-BLANQUET 1964, KLIKA 1955). Nomenklatúra taxónov je podla Ehrendorfera (EHRENDORFER 1973), v niektorých prípadoch podla Rothmalera (ROTHMALER 1976) a Májovského et al. (MÁJOVSKÝ et al. 1978).

STRUČNÁ FYTOCENOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA A SYNTAXONÓMIA

Prirodzené nitrofilné lemové fytocenózy, sprevádzajúce vodné toky v Javorníkoch, sa zaradili do asociácie *Petasitetum hybridii* OBERD. 49 em. KOPECKÝ 69 subasociácie *typicum* KOPECKÝ 69 zväzu *Petasition officinalis* SILL. 33 em. KOPECKÝ 69 radu *Petasito-Chaerophylletalia* MORARIU 67. Porasty anthropicky ovplyvnené sa zaradili do asociácie *Chaerophylletum aromatici* (Tx. 67) NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69 zväzu *Aegopodion podagrariae* Tx. 67 em. GUTTE 72 radu *Lamio (albi)-Chenopodieta* (boni-henrici) KOPECKÝ 69.

Syntaxonomická charakterizácia a diferenciácia sa spravila na základe význačných a diferenciálnych druhov, ktoré stanovil KOPECKÝ (1969).

Petasitetum hybridii typicum KOPECKÝ 69 — sudetsko-karpatská rasa

Fytocenózy tohto spoločenstva sú v Javorníkoch rozšírené najmä na horných tokoch potokov — miestami sú iba maloplošne vyvinuté ako úzke lemy okolo potoka, miestami, na širších brehových terasách, zaberajú väčšie plochy. Druhové zloženie a štruktúra študovaných porastov v základe zodpovedá diagnóze Kopeckého (KOPECKÝ 1969). Vzhľadom na to, že v uzáveroch dolín sú svahy obvykle aspoň na jednej strane potoka zalesnené, *Petasitetum hybridii typicum* tu prichádza do kontaktu najčastejšie s lesnými porastami zväzu *Fagion LUQ.* 26 em. PAWL. 28. Následok toho je vyššie zaštúpenie lesných druhov v porastoch asociácie. Pri rozširovaní druhu *Petasites hybridus* na menej zaplavované miesta vyššie položených brehových partií, dostáva sa spoločenstvo do kontaktu s fytocenózami zväzu *Cynosurion* Tx. 47 a *Arrhenatherion* W. KOCH 26 a do jeho floristickej skladby prenikajú lúčne druhy. Takéto fytocenózy zodpovedajú odvodenému anthropogénemu spoločenstvu *Petasites hybridus* triedy *Galio-Urticetea*, ktoré uvádzajú KOPECKÝ et HEJNÝ (1971), preto v Javorníkoch neboli študované v rámci *Petasitetum hybridii typicum*. Z lúčnych druhov, ktoré KOPECKÝ (1969) a KOPECKÝ et HEJNÝ (1971) označujú ako diferenciálne pre rad *Lamio (albi)-Chenopodieta* (boni-henrici), v prirodzených porastoch sa tu často vyskytuje *Veronica chamaedrys* a *Taraxacum officinale*.

Študované porasty sa začlenili do subasociácie *P. h. typicum* KOPECKÝ 69. Niektoré fytocenózy však inklinujú k subasociácii *P. h. doronicetosum* KOPECKÝ 69. Označili sa ako variant s *Thalictrum aquilegiifolium*. Ostatné horské bylinky (*Ranunculus platanifolius*, *Luzula sylvatica*, *Veratrum lobelianum*, *Acetosa alpestris*), ktoré pomerne zriedkavo zostupujú z hlavného hrebeňa Javorníkov aj do uzáverov dolín, možno v porastoch *Petasitetum hybridii typicum* zaznamenať iba ojedinele (tab. 1).

Chaerophylletum aromatici (Tx. 67) NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69

V dolinách Javorníkov toto spoločenstvo tvorí lemy na brehoch potokov, pozdĺž údolných ciest ale aj vedľa záhrad a dvorov usadlostí. Pretože sa štúdium obmedzilo iba na pobrežné lemy v horných častiach dolín, získaný fytocenologický materiál predstavuje fytocenózy málo ruderalizované. V ana-

Tab. 2. — *Chaerophylletum aromatici* (Tx. 67) NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69

Subasociácia — Subassoziation	<i>chaerophylletosum hirsuti</i> NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69															<i>typicum</i> (Tx. 67) NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69							
	Stálosť —								Stetigkeit														
Číslo zápisu — Nr. der Aufnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Nadmor. výška v m —	590	630	600	620	610	540	660	650	550	600	600	560	690	520	640	700	520	630	530	520	600	610	530
Meereshöhe in m																							
Plocha zápisu v m ² —	8	15	10	8	10	8	10	15	10	12	15	15	10	15	15	10	20	8	10	10	8	10	
Aufnahmefläche in m ²																							

Význačný druh asociácie — Kennart der Assoziation

Chaerophyllum aromaticum L. 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 V

Diferenciálne druhy subasociácie — Trennarten der Subassoziation

<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3	+	.	.	III
<i>Geum rivale</i> L.	.	+	.	1	.	+	1	.	.	.	1	+	II

Diferenciálne druhy radové — Trennarten der *Lamio (albi)* — *Chenopodietalia (boni-henrici)**Taraxacum officinale* agg. + + + 1 . + + + 1 . + + + + 1 1 1 1 1 + + 1 + V*Veronica chamaedrys* L. + 1 1 + + + 1 1 1 . + . 1 1 1 1 1 + + + 1 + V*Ranunculus acris* L. r + + + . + + + + + . + + + + + + + + + + IVAg *Agropyron repens* (L.) P.B. . . + . + 1 1 + 1 . . . + + + + + + 1 + 1 1 1 2 IV*Acetosa pratensis* MILL. + 1 + + + r + + + + + + + + r . . . + IV*Plantago major* L. . . . + + + + + + . . + + + + + + + + IV*Poa annua* L. + . . . + + . 1 + + . . . + + + + + + + + IV*Arrhenatherum elatius* (L.) J. et C. PRESL . 1 + . + . . + + . + r . + + + + . . III*Equisetum arvense* L. . + . . . + . + + + + r . 1 + + + . . III*Geranium pratense* L. r 1 . . r 1 + + + . . + r III*Alopecurus pratensis* L. + + . + r + . + + + . II*Potentilla anserina* L. + r r . . + + + . IIVýznačné a diferenciálne druhy triedne — Kenn- und Trennarten der *Galio-Urticetea**Urtica dioica* L. 1 + . + 2 + 1 1 2 2 . 2 1 1 1 2 2 1 2 + + 1 + V*Aegopodium podagraria* L. . 1 2 . . 1 2 1 3 1 1 1 . 2 + . 1 2 2 1 1 2 1 V*Geranium phaeum* L. 1 1 1 2 2 + 1 2 2 2 1 2 1 . 1 2 1 . . 2 1 VAg *Anthriscus sylvestris* (L.) HOFFM. . + + . + . 1 + 1 + + + + + + 1 1 + + . . IVAg *Rumex *sylvestris* (WALLR.) ČELAK. . . r r + 1 + . + + + + + . + r + + + r + + IV

Tab. 2. — (Pokračovanie 1.)

Číslo zápisu — Nr. der Aufnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<i>Lamium maculatum</i> L.	+	+	+	.	.	+	1	.	1	2	2	1	.	1	2	.	2	1	+	.	.	1	+	IV
<i>Geum urbanum</i> L.	.	r	.	+	+	+	+	1	+	.	+	+	+	+	+	.	+	.	III
<i>Glechoma hirsuta</i> W. et K.	1	1	1	1	.	1	.	.	2	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	II
<i>Glechoma hederacea</i> L.	+	1	.	+	+	I	
<i>Silene dioica</i> (L.) CLAIRV.	+	+	+	+	+	+	.	.	I
<i>Cruciata laevipes</i> OPIZ	+	1	1	.	+	+	I
<i>Galium aparine</i> L.	+	1	.	.	.	+	+	+	.	.	I	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	+	+	.	.	.	+	+	+	.	.	I	
Ostatné druhy — Übrige Arten																								
a) <i>Arctium tomentosum</i> MILL.	.	.	.	r	.	.	r	.	+	.	.	.	r	.	.	r	r	1	1	+	1	1	+	III
<i>Arctium lappa</i> L.	r	+	r	r	I
b) <i>Alliaria petiolata</i> (M.B.) CAVARA et GRANDE	.	.	+	.	+	.	+	.	.	.	+	.	.	+	.	+	II	
<i>Epilobium montanum</i> L.	r	.	.	+	r	r	.	r	II
c) <i>Dactylis glomerata</i> agg.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V
<i>Ag</i> <i>Heracleum sphondylium</i> L.	+	1	+	+	+	+	+	1	.	+	1	+	1	+	+	1	+	1	+	1	+	1	+	V
<i>Galium mollugo</i> L.	r	+	+	.	.	.	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	IV
<i>Mentha longifolia</i> (L.) HUDES.	.	.	.	+	+	.	.	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	IV
<i>Vicia sepium</i> L.	+	+	+	+	+	.	1	+	.	+	+	+	+	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	III
<i>Alchemilla xanthochlora</i> ROTHM.	r	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	r	III
<i>Poa trivialis</i> L.	1	.	.	+	+	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	III
<i>Festuca pratensis</i> HUDES.	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	III
<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	+	.	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	III
<i>Crepis biennis</i> L.	.	r	r	.	r	+	.	.	+	.	+	r	.	r	.	.	II
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	.	1	.	+	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	III
<i>Vicia cracca</i> L.	r	+	.	+	+	+	+	+	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	II
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	.	.	.	r	.	r	.	.	r	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	II
<i>Geranium sylvaticum</i> L.	+	+	+	1	+	+	.	+	.	+	.	+	II
<i>Phleum pratense</i> L.	+	1	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.	II
<i>Stellaria graminea</i> L.	+	.	r	+	.	+	1	1	1	1	1	1	1	1	II
<i>Ajuga reptans</i> L.	.	.	.	+	+	.	.	+	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	II	
<i>Cruciata glabra</i> (L.) EHREND.	r	1	+	1	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	II
<i>Cirsium rivulare</i> (JACQ.) ALL.	.	+	.	.	r	.	r	.	.	+	.	+	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	r	II

Tab. 2. — (Pokračovanie 2.)

Číslo zápisu — Nr. der Aufnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<i>Hypericum maculatum</i> Cr.	r	.	.	.	r	.	+	+	+	II	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	r	r	.	.	r	.	.	r	.	.	.	+	.	.	II	
<i>Agrostis tenuis</i> SIBTH.	+	+	+	.	+	.	I	
<i>Achillea millefolium</i> L.	+	+	+	+	+	+	.	.	+	+	.	I	
d) <i>Ranunculus repens</i> L.	1	+	+	1	1	1	1	1	.	1	+	1	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	1	1	1	+	.	.	+	.	1	.	.	.	II	
<i>Rumex crispus</i> L.	.	.	.	r	+	r	+	r	+	.	.	.	II	
<i>Trifolium repens</i> L.	.	.	.	r	.	.	.	+	+	.	.	.	3	.	.	.	I	
e) <i>Senecio *fuchsii</i> (GMEL.) ŠELAK.	+	+	1	1	+	+	+	+	+	.	1	+	+	.	.	+	+	+	.	+	+	+	V	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	1	+	.	2	+	1	1	+	+	1	.	1	+	+	+	.	.	1	+	.	1	+	.	IV
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	.	.	.	1	+	+	+	.	1	.	+	2	1	.	.	.	+	+	.	+	.	.	III	
<i>Campanula trachelium</i> L.	+	+	+	.	.	+	.	+	.	+	.	+	+	+	.	.	+	+	.	+	.	.	III	
<i>Cardamine impatiens</i> L.	+	.	.	1	1	.	.	.	+	.	1	1	.	.	+	.	.	+	.	+	.	.	II	
<i>Petasites albus</i> (L.) GAERTN.	1	+	.	+	1	.	.	.	+	.	.	+	.	.	1	.	+	II	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (HUDS.) P.B.	.	+	.	.	r	+	.	.	+	+	.	.	+	+	II	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	.	.	r	.	+	+	+	.	.	+	.	.	+	.	.	II	
<i>Asarum europaeum</i> L.	1	.	1	.	+	+	.	.	.	+	.	+	+	II	
f) <i>Rubus idaeus</i> L.	.	+	+	+	+	1	+	+	1	.	1	+	+	1	1	.	.	+	+	1	+	+	.	IV
<i>Fragaria vesca</i> L.	r	+	1	.	.	+	+	+	+	II
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	.	+	.	+	r	+	.	.	+	+	II	
g) <i>Stellaria nemorum</i> L.	3	.	1	2	2	.	1	1	.	2	1	1	1	+	.	1	1	.	.	.	+	1	III	
<i>Primula elatior</i> (L.) HILL	.	+	1	.	+	1	+	+	.	.	1	+	+	1	1	.	.	1	III	
<i>Agropyron caninum</i> (L.) P.B.	.	+	+	.	+	+	.	+	.	1	2	+	.	.	+	.	+	.	.	+	.	.	III	
<i>Petasites hybridus</i> (L.) G. M. et SCH.	+	1	.	1	.	1	.	I	

Druhy so zriedkavejším výskytom — Arten, die nur selten vorkommen: E1: *Arctium minus* (zápis — Aufnahme 2, 3), *Valeriana officinalis* L. (18, 21, 22, 11), *Carduus personata* (L.) JACQ. (2, 15, 18), *Prunella vulgaris* L. (4, 6, 21), *Trisetum flavescens* (L.) P.B. (2, 8, 15), *Poa nemoralis* L. (1, 15, 19), *Leucanthemum vulgare* LAMK. (5, 15, 17), *Festuca *arundinacea* SCHREB. (4, 30, 21), *Trifolium pratense* L. (9, 17, 22), *Eupatorium cannabinum* L. (15, 19, 23), *Galeopsis speciosa* MILL. (2, 6, 19), *Carex sylvatica* HUDS. (6, 19, 21, 11), *Sympyrum officinale* L. (6, 17), *Stellaria media* (L.) VILL. (6, 13), *Tussilago farfara* L. (6, 9, 17, 19, 20, 22), *Geranium robertianum* L. (4, 9, 11), *Lysimachia nemorum* L. (2, 3, 11), *Myosotis laxiflora* RCHB. (1, 4, 10, 11, 12), *Myosotis sylvatica* EHRH. ex HOFFM. (5, 13), *Colchicum autumnale* L. (14, 15), *Rubus hirtus* W. et K. (1, 9, 15)

Stachys alpina L. (2, 6), *Artemisia vulgaris* L. (9, 18), *Matricaria discoidea* DC. (20, 22), *Sympytum tuberosum* L. (2, 3, 11), *Cirsium oleraceum* (L.) SCOP. (11, 14), *Caltha palustris* L. (10, 11, 12), *Bromus benekenii* (LANGE) TRIMEN (2, 20), *Cirsium arvense* (L.) SCOP. (22), *Geranium palustre* L. (14), *Armoracia rusticana* G. M. SCH. (17), *Potentilla reptans* L. (22).

Vysvetlivky k tab. 2. — Erklärungen zur Tab. 2:

- Ag — diferenciálne druhy zväzu *Aegopodium podagrariae* — *Aegopodium*-Trennarten
a) — diferenciálne druhy zväzu *Arction* — *Arction*-Trennarten
b) — diferenciálne druhy zväzu *Geo-Alliarion* — *Geo-Alliarion*-Trennarten
c) — lúčne druhy — Wiesenarten der *Molinio-Arrhenatheretea*
d) — druhy zošlapovaných pôd — Trittrasenarten der *Plantaginetea majoris*
e) — lesné druhy — Laubwaldarten der *Querco-Fagetea*
f) — druhy rúbanísk — Kahlschlagarten der *Epilobietea angustifolii*
g) — význačné a diferenciálne druhy zväz řasovky *Petasition officinalis* a radu *Petasito-Chaerophylletalia* — *Petasition officinalis*- und *Petasito-Chaerophylletalia*-Kennarten und Trennarten

lyzovaných porastoch chýbajú význačné druhy radu *Lamio (albi)-Chenopodietalia (boni-henrici)*, ako indikátory anthropicky silnejšie ovplyvnených stanovišť, ktoré sa vyskytujú na stredných a dolných tokoch v podhorí Javorníkov. Oproti prirodzeným fytocenózam zväzu *Petasition officinalis* sú však tieto porasty ohraňčené diferenciálnymi druhmi radu *Lamio (albi)-Chenopodietalia (boni-henrici)*, z ktorých sú okrem lúčnych prvkov prítomné aj druhy zošlapovaných pôd. Pobrežné fytocenózy tu často vytvárajú lem medzi brehom potoka a údolnou cestou.

Hlavnou dominantou je *Chaerophyllum aromaticum*, ktorý je v sudetskohokarpatskej oblasti dôležitou zložkou aj prirodzených lemových fytocenóz zväzu *Petasition officinalis*. Preto KOPECKÝ (1974) považuje *Chaerophyllum aromaticum* nie za význačný ale iba za diagnosticky významný alebo vedúci druh asociácie *Chaerophylletum aromatici* (taktiež GRÜLL 1974). Druhové zloženie študovaných porastov, odhliadnuť od absencie niektorých anthropofytov, ich štruktúra a synekológia zodpovedajú diagnóze asociácie, ktorú uviedli NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ, NEUHÄUSL et HEJNÝ (1969). Avšak následkom lokalizácie fytocenóz v zalesnenom území, obsahujú tieto vo svojej druhovej garniture väčší počet lesných druhov. Okrem toho, vlhké, zatienené stanovištia potočného pobrežia vyhovujú viacerým hygrofytom, z ktorých sa často so zvýšenou dominanciou vyskytuje *Chaerophyllum hirsutum* a *Stellaria nemorum*. Takéto porasty sa zaradili do subasociácie *Ch. a. chaerophylletosum hirsuti* NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69. Aj v študovanej oblasti možno konštatovať v súhlase s Grüllom (GRÜLL 1974), že táto subasociácia predstavuje spojovací článok od anthropogénnych lemových fytocenóz k prirodzeným spoločenstvám zväzu *Petasition officinalis*. Ojedinele sa tu vyskytli aj také porasty s dominujúcim *Chaerophyllum aromaticum*, ktoré možno považovať za blízke prirodzeným. Hlavnými diagnostickými znakmi patria tiež do subasociácie *Ch. a. chaerophylletosum hirsuti* (zápis č. 10, 11, 12 v tab. 2). Ostatné porasty, ktoré sú floristicky dosť homogénne, sa zaradili do subasociácie *Ch. a. typicum* (Tx. 67) NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69.

Študované porasty asociácie *Chaerophylletum aromatici* v anthropicky málo ovplyvnených uzáveroch dolín zodpovedajú svojím druhovým zložením Kopeckého a Hejného (KOPECKÝ et HEJNÝ 1971) odvodenejmu anthropogénemu spoločenstvu *Chaerophyllum aromaticum* triedy *Galio-Urticetea* v zmysle ich klasifikačnej metodiky syntaxonomických derivačných radov. Zaradili sa do zväzu *Aegopodium podagrariae* a radu *Lamio (albi)-Chenopodietalia (boni-henrici)* vzhľadom na prítomnosť diferenciálnych druhov tohto radu v ich druhovej skladbe.

Zväz *Aegopodium podagrariae* je oproti ostatným zväzom radu *Lamio (albi)-Chenopodietalia (boni-henrici)* diferencovaný iba negatívne (KOPECKÝ 1974). SİSSİNGH (1973) študoval pozitívnu diferenciáciu zväzu *Aegopodium* oproti zväzom *Geo-Alliarion* (OBERD. 57) LOHM. et OBERD. 67. V tab. č. 2 sú diferenciálne druhy zväzu *Aegopodium* vyznačené podla práce Sissingha (SİSSİNGH 1973).

POROVNANIE S LITERATÚROU

Súhrnné a kritické syntaxonomické zhodnotenie publikovaných údajov o prirodzených lemových nitrofilných spoločenstvách podal KOPECKÝ (1969). GÖRS et MÜLLER (1969) v súhlase s klasifikáciou Oberdorfera et al. (OBERDORFER et al. 1967) zaradili spoločenstvo *Chaerophyllo-Petasitetum hybridi GAMS apud HEGI* 29 do zväzu *Convolvulion sepiae* Tx. 47 radu *Galio-Alliarieta-*

lia (Tx. 50) OBERD. 67. SISSINGH (1973), ktorý sa pridŕžal Tüxenovej konceptie (TÜXEN 1967) širokého ponímania zväzu *Aegopodium podagrariae*, v ktorom boli zahrnuté aj prirodzené pobrežné spoločenstvá, navrhoval rozčleniť zväz na dva podzväzy, aby sa mohli spoločenstvá stredných horských polôh v podzväze *Melandrio-Aegopodium* odlišiť od spoločenstiev nížin v podzväze *Lamio-Aegopodium*. KOPECKÝ (1969, 1974) však zdôvodnil oddelenie prirodzených spoločenstiev do radu *Petasito-Chaerophylletalia* MORARIU 67, ktorý by zahŕňal zväzy *Convolvulion sepiae* Tx. 47 a *Petasition officinalis* SILL. 33 em. KOPECKÝ 69.

Klasifikácia anthropogénnych nitrofilných lemových spoločenstiev sa riešila u viacerých autorov nejednotne. Asociáciu *Chaerophylletum aromatici* definovali NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ, NEUHÄUSL et HEJNÝ 1969 oddelením Tüxenovej subasociácie *Chaerophyllum aromaticum* od spoločenstva *Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae* Tx. 67 ako samostatnej vikarizujúcej asociácie. V súhlase s Tüxenom (TÜXEN 1967) ju začlenili do zväzu *Aegopodium podagrariae*. GÖRS et MÜLLER (1969) (sensu OBERDORFER et al. 1967) považovali zväz *Aegopodium* za synonymum radu *Galio-Alliarietalia* a jeho spoločenstvá priradili k zväzom *Convolvulion sepiae* Tx. 47 a *Geo-Alliarion* (OBERD. 57) LOHM. et OBERD. 67 radu *Galio-Alliarietalia* (Tx. 50) OBERD. 67 triedy *Artemisietae* LOHM., PRSG. et Tx. 50.

KOPECKÝ (1969) oddelil od triedy *Artemisietae* mezofilné a hygrofilné spoločenstvá radu *Galio-Alliarietalia* a definoval ich ako triedu *Galio-Urticetea* PASS. 67 em. KOPECKÝ 69. Na rozdiel od ostatných autorov, ktorí pri klasifikácii nerozlišovali nitrofilné spoločenstvá prirodzené a anthropogénne, vyčlenil nový rad *Lamio (albi)-Chenopodieta (boni-henrici)*, do ktorého zahrnul zväz *Galio-Alliarion* (OBERD. 57) LOHM. et OBERD. 67, *Arction* Tx. 37, *Aegopodium podagrariae* Tx. 67 p. p., *Rumicion alpini* (RÜBEL 33) KLIKA 44 a neskôr (KOPECKÝ 1974) aj *Carduo-Urticetum* HADAČ 62 a *Rumicion obtusifolii* GUTTE 72. Týmto bol rad *Galio-Alliarietalia* rozdelený p. p. do radu *Petasito-Chaerophylletalia* MORARIU 67 a do radu *Lamio (albi)-Chenopodieta (boni-henrici)* KOPECKÝ 69. GUTTE (1972) uvádza asociáciu *Chaerophylletum aromatici* vo zväze *Aegopodium*, pričom tento zväz začleňuje do radu *Galio-Alliarietalia* v rámci triedy *Galio-Urticetea* PASS. 67. HADAČ (1978) pri charakterizácii viacerých spoločenstiev zväzu *Aegopodium*, zaradil tento zväz do radu *Lamio (albi)-Chenopodieta (boni-henrici)* KOPECKÝ 69 triedy *Galio-Urticetea* PASS. 67 em. KOPECKÝ 69.

Lokality zápisov

Tab. 1.

1. Dolina Štiavnik, na sútoku oboch ramien potoka z doliny Ráztoča a Buntovej doliny, 23. 7. 1979. — 2. Asi 0,5 km poniže zápisu č. 1, 23. 7. 1979. — 3. Dolina Papradno, ľavostranné rameno potoka pod kótou Veľký Javorník, 16. 6. 1979. — 4. Pravostranné rameno potoka Papradno, asi 0,5 km povyše osady Podjavorník, 16. 6. 1979. — 5. Dolina Malá Stanovnice pod kótou Stolečný vrch, asi 0,5 km poniže sútoku oboch ramien potoka, 22. 7. 1979. — 6. Asi 200 m povyše zápisu č. 5, 22. 7. 1979. — 7. Dolina Štiavnik, pravostranné rameno potoka v Buntovej doline, 23. 7. 1979. — 8. Asi 0,5 km poniže zápisu č. 7, 23. 7. 1979. — 9. Dolina Papradno, as 0,5 km poniže sútoku oboch ramien potoka pod osadou Podjavorník, 16. 6. 1979. — 10. Dolina Veľká Stanovnice, pravostranné rameno potoka pod kótou Malý Javorník, 1. 7. 1979. — 11. Dolina Malé Karlovce—Podtaté, na sútoku dvoch ramien potoka nedaleko osady Kubáň, 21. 7. 1979. — 12. Dolina Malé Karlovce—Podtaté, pravostranné rameno potoka nedaleko osady Na Lemešné, 21. 7. 1979. — 13. Dolina Veľká Vranča, as 0,5 km poniže sútoku potokov pod kótou Kohútka-Portáš, 11. 6. 1979. — 14. Dolina Veľká Stanovnice, pravostranné rameno potoka, 1. 7. 1979. — 15. Taktiež, 1. 7. 1979. — 16. Dolina Papradno, pravostranné rameno potoka, as 1 km povyše osady Podjavorník, 16. 6. 1979. — 17. Dolina Veľká Vranča, podobne ako zápis

č. 13, 11. 6. 1979. — 18. Dolina Velká Stanovnice, podobne ako zápis č. 14, 11. 6. 1979. — 19. Dolina Maríková, pravostranné rameno potoka pod kótou Stolečný vrch, asi 0,5 km poníže osady Stolečné, 30. 6. 1979. — 20. Dolina Malé Karlovice—Podťaté, podobne ako zápis č. 11, 21. 7. 1979. — 21. Dolina Velká Vranča, podobne ako zápis č. 13, 11. 6. 1979. — 22. Dolina Malá Stanovnice, podobne ako zápis č. 5, 22. 7. 1979. — 23. Dolina Maríková, medzi osadou Stolečné a Vlkov, 30. 6. 1979. — 24. Dolina Kychová pod kótou Makytá, asi 0,5 km poníže poslednej horárne, 10. 6. 1979. — 25. Dolina Kychová, asi 0,5 km povyše osady Kychová, 10. 6. 1979. — 26. Dolina Čubov, asi 0,5 km povyše osady Břežitá, 18. 6. 1979. — 27. Dolina Maríková, Iavostranné rameno potoka, povyše osady Vlkov, 30. 6. 1979. — 28. Dolina Lazy pod Makytou, na sútoku oboch ramien potoka pri osade Čertov, 30. 6. 1979. — 29. Dolina Kychová, podobne ako zápis č. 24, 10. 6. 1979. — 30. Dolina Kychová, podobne ako zápis č. 25, 10. 6. 1979.

Tab. č. 2

1. Dolina Lazy pod Makytou, Iavostranné rameno potoka pod kótou Kohútka, asi 0,5 km povyše osady Lamže, 24. 7. 1979. — 2. Dolina Velká Stanovnice, pravostranné rameno potoka pod kótou Malý Javorník, 1. 7. 1979. — 3. Taktiež, 1. 7. 1979. — 4. Dolina Papradno, pravostranné rameno potoka pod kótou Malý Javorník, asi 1 km povyše osady Podjavorník, 2. 7. 1979. — 5. Taktiež, 2. 7. 1979. — 6. Dolina Kychová, nedaleko poslednej horárne, 20. 7. 1979. — 7. Dolina Malé Karlovice—Podťaté, pravostranné rameno potoka, nedaleko osady Kubáň, 21. 7. 1979. — 8. Taktiež, 21. 7. 1979. — 9. Dolina Papradno medzi osadou Ostravice a Podjavorník, 24. 7. 1979. — 10. Dolina Papradno, pravostranné rameno potoka pod kótou Malý Javorník, 2. 7. 1979. — 11. — Dolina Malá Stanovnice, asi 0,5 km poníže sútoku oboch ramien potoka, 22. 7. 1979. — 12. Dolina Papradno, poníže sútoku oboch ramien potoka, medzi osadou Podjavorník a Ostravice, 16. 6. 1979. — 13. Dolina Papradno, podobne ako zápis č. 4, 2. 7. 1979. — 14. Dolina Kychová, na okraji osady Kychová, 20. 7. 1979. — 15. Dolina Velká Stanovnice, pravostranné rameno potoka, nedaleko poslednej usadlosti, 17. 6. 1979. — 16. Dolina Papradno, podobne ako zápis č. 4, 2. 7. 1979. — 17. Dolina Čubov, pri osade Břežitá, 18. 7. 1979. — 18. Dolina Velká Stanovnice, podobne ako zápis č. 15, 1. 7. 1979. — 19. Dolina Kychová, blízko osady Kychová, 20. 7. 1979. — 20. Taktiež, 20. 7. 1979. — 21. Dolina Velká Vranča, nedaleko poslednej usadlosti, 11. 6. 1979. — 22. Dolina Malá Stanovnice, na okraji osady Malá Stanovnice, 22. 7. 1979. — 23. Dolina Čubov, podobne ako zápis č. 17, 18. 6. 1979.

Pokryvnosť E1 je u všetkých zápisov 100 %.

SÚHRN

Práca prináša fytocenologický materiál nitrofilných lemových spoločenstiev triedy *Galio-Urticea* Pass. 67 em. KOPECKÝ 69 z pohoria Javorníky. Študovali sa iba pobrežné vytrvalé nitrofilné fytocenózy v submontánom stupni, v anthropicky málo ovplyvnených horných častiach dolín.

Prirodzené porasty častejšie zaplavovaných brehových valov sa zaradili do asociácie *Petasitetum hybidi* OBERD. 49 em. KOPECKÝ 69 zväzu *Petasition officinalis* SILL. 33 em. KOPECKÝ 69. Študované fytocenózy sa začlenili do subasociácie *P. h. typicum* KOPECKÝ 69, ale časť porastov v hornom submontánom stupni predstavuje prechod k subasociácii *P. h. doronicetosum* KOPECKÝ 69. Označili sa ako variant s *Thalictrum aquilegifolium*. Anthropogénne porasty vyšie položených brehových partií, ktoré sú v kontakte so spoločenstvami lúk a zošlapovaných pôd, sa zaradili do asociácie *Chaerophylletum aromatici* (Tx. 67) NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69 zväzu *Aegopodium podagrariae* Tx. 67 em. GUTTE 72 radu *Lamio (albi)-Chenopodietales (boni-henrici)* KOPECKÝ 69. *Chaerophylletum aromatici* sa tu vyskytuje v dvoch subasociáciách: 1. *Ch. a. typicum* (Tx. 67) NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69, 2. *Ch. a. chaerophylletosum hirsuti* NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69.

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit bringt Aufnahmematerial der nitrophilen Saumgesellschaften der Klasse *Galio-Urticetea* Pass. 67 em. KOPECKÝ 69 des Javorníky-Gebirges. Studiert wurden nur ausdauernde nitrophile Bachufersaumgesellschaften in der submontanen Stufe, in den anthropogen wenig beeinflussten oberen Teilen der Täler.

Natürliche Bestände der öfter überschwemmten Uferwälle wurden in die Assoziation *Petasitetum hybidi* OBERD. 49 em. KOPECKÝ 69 des Verbandes *Petasition officinalis* SILL. 33 em. KOPECKÝ 69 der Ordnung *Petasito-Chaerophylletalia* MORARIU 67 eingereiht. Anthropogene Bestände der höheren Uferpartien, die mit Wiesen- und Trittgessellschaften in Kontakt stehen, wurden in die Assoziation *Chaerophylletum aromatici* (Tx. 67) NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69 des Verbandes *Aegopodium podagrariae* Tx. 67 em. GUTTE der Ordnung *Lamio (albi)-Chenopodietales (boni-henrici)* KOPECKÝ 69 eingereiht. Das *Petasitetum hybidi* im Javorníky-Gebirge gehört zur sude-

tisch-karpatischen geographischen Rasse. Die studierten Phytozönosen wurden in die Subassoziation *Petasitetum hybriди typicum* KOPECKÝ 69 eingegliedert, zum Teil stellen aber diese Bestände im oberen Teil der submontanen Stufe einen Übergang zur Subassoziation *P. h. doronicet osum* KOPECKÝ 69 dar. Sie wurden als Variante mit *Thalictrum aquilegiifolium* bezeichnet. Das *Chaerophylletum aromatici* wurde nur in wenig ruderalisierten Bachufersäumen analysiert. Es kommt hier in zwei Subassoziationen vor: 1. *Ch. a. typicum* (Tx. 67) NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69 und 2. *Ch. a. chaerophylletosum hirsuti* NEUH. Z., NEUH. R. et HEJNÝ 69. Die feuchten, schattigen Bachuferstandorte begünstigen Vorkommen einiger hygrophiler Arten dieser Gesellschaft und deshalb sind an den Oberläufen der Bäche des Javorníky-Gebirges die Bestände der Subassoziation *Ch. a. chaerophylletosum hirsuti* ziemlich verbreitet.

LITERATÚRA

- BRAUN-BLANQUET J. (1964): Pflanzensoziologie. — Wien et New York.
- EHRENDORFER F. (1973): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. Ed. 2. — Stuttgart.
- GRÜLL F. (1974): Chaerophylletum aromatici (Tüxen 1967) Neuh. Z., Neuh. R. et Hejný 1969 im Moravský Kras (Mährischer Karst). — Preslia, Praha, 46 : 350—358.
- GUTTE P. (1972): Ruderalpflanzengesellschaften West- und Mittelsachsens. — Feddes Repert., Berlin, 83 : 11—122.
- GOŘS S. et T. MÜLLER (1969): Beitrag zur Kenntnis der nitrophilen Saumgesellschaften Südwestdeutschlands. — Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Todenmann ü. Rinteln, 14 (ser. n.) : 153—168.
- HADAČ E. (1978a): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE. Bohemia. — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13 : 129—163.
- (1978b): Anthriscetum sylvestris, nová asociace svazu Aegopodion. — Preslia, Praha, 50 : 277—280.
- HILBIG W., W. HEINRICH et E. NIEMANN (1972): Übersicht über Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR, IV. Die nitrophilen Saumgesellschaften. — Hercynia, Leipzig, 9 (ser. n.) : 229—270.
- KLIKA J. (1955): Nauka o rostlinných společenstvích (fytocenologie). — Praha.
- KOPECKÝ K. (1969): Zur Syntaxonomie der natürlichen nitrophilen Saumgesellschaften in der Tschechoslowakei und zur Gliederung der Klasse Galio-Urticetea. — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4 : 235—259.
- (1974a): Kritische Bemerkungen zur Syntaxonomie einiger nitrophilen Apophyten-Gesellschaften. — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9 : 329—340.
- (1974b): Die anthropogene nitropheile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. — Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ser. Math.-Natur., Praha, 84/1 : 1—173.
- KOPECKÝ K. et S. HEJNÝ (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. — Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ser. Math.-Natur., Praha, 81/9 : 1—126.
- (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8 : 49—66.
- MÁJOVSKÝ J. et al. (1978): Index of Chromosome Numbers of Slovakian Flora (Part 6). — Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen., Bot., Bratislava, 26 : 1—42.
- NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ Z., R. NEUHÄUSL et S. HEJNÝ (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodium podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. — Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Todenmann ü. Rinteln, 14 (ser. n.) : 136—152.
- NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ Z., R. NEUHÄUSL (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodiumpodagrariae Tx. 1967 in Böhmen. — Preslia, Praha, 42 : 82—89.
- OBERDORFER E. et al. (1967): Systematische Übersicht der westdeutschen Phanerogamen- und Gefäßkryptogamen-Gesellschaften. — Schriftenreihe für Vegetationskunde, Bad Godesberg, 2 : 7—62.
- PASSARGE H. (1967): Über Saumgesellschaften im nordostdeutschen Flachland. — Feddes Repert., Berlin, 74 : 145—158.
- ROTHMALER W. (1976): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Kritischer Band. — Berlin.
- SISSINGH G. (1973): Über die Abgrenzung des Geo-Alliarion gegen das Aegopodium podagrariae. — Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Todenmann ü. Rinteln, 15/16 (ser. n.) : 60—65.
- TÜXEN R. (1967): Die nitrophilen Saumgesellschaften Mitteleuropas. — Contr. Bot., Cluj, 1967 : 431—453.
- VESECKÝ A. [red.] et al. (1958): Atlas podnebí Československé republiky. — Praha.

Došlo 10. decembra 1979