

New species of the genus *Campanula* from Central Turkey

Nový druh rodu *Campanula* ze Středního Turecka

Josef J. Halda

HALDA J. J. (1989): New species of the genus *Campanula* from Central Turkey. — *Preslia, Praha*, 61 : 321–322.

Keywords: *Campanula* sect. *Tracheliospis*, *C. bluemelii* sp. nova, taxonomy, Central Turkey

Campanula bluemelii, a new species related to *C. buseri* is described from Central Turkey.

517 82 Sedloňov v Orlických horách 125, Czechoslovakia

Campanula bluemelii HALDA, sp. nova

Caules e rhizomate lignescente numerosi, ± 9–15 cm alti, tenues, flexuosi, simplices, tota longitudine foliosi, glabri. Folia inferiora et media lanceolata vel obovata, apice obtusa vel obtusiuscula, ± 1, 5–2,5 × 0,7–1 cm magna, viridia, utrinque glabra, margine integerrima (infima setulis 0,1–0,2 mm longis instructa, cetera glaberrima), superiora sensim decrescentia. Inflorescentia corymbosa, 5–15-flora. Calyx exappendiculatus. Laciniae calycis erectae, glabrae, angustatae (infra ± 0,5 mm), 1,2–1,5 mm longae. Corolla tubulosa, 5–7 mm longa, albida, glabra vel disperse pilosa; lobi erecti, 0,8–1 mm longi. Stylus 12–13 mm longus, superne saeppe setulis sparsis instructus. Stigmata 3, ± recurvata. Semina 0,6–0,8 mm longa et 0,2–0,3 mm late, pallidolutescentia, basi et apicem brunnea, nitida.

A *C. buseri* DAMBOLDT caulinibus et foliis glabris viridibus, foliis apice obtusis, calycis lacinia et corollae lobis brevioribus differt.


Typus: Turcia centralis, montes Taurii, Bolkar dag: in declivibus lapidosis montis Medesiz, solo calcareo, 1500–1800 m s.m. Leg. J. J. Halda et J. Haldová, IX. 1988, PR.

New described species belongs to sect. *Tracheliospis* and is closely related to *C. buseri* DAMBOLDT. It differs by its glabrous, shiny-green branchlets and leaves, which are obtuse and entire. Sepals and petals-lobes are shorter. The pale-yellow seeds are similar to those of *C. buseri* DAMBOLDT.

SOUHRN

Položka zvonku, sebraná v Centrálním Turecku, náleží novému druhu. Od příbuzného druhu *C. buseri* DAMBOLDT se liší lysými, zelenými a lesklými větévkatmi a listy, tupými vrcholy listů a kratšími korunními cípy a kališními ušty.

Received 2 October 1988



Campanula bluemelii Halda

Fig. 1. — *Campanula bluemelii* HALDA